

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА



Моля, преди да започнете да приемате това лекарство прочетете внимателно цялата листовка.

- Запазете тази листовка. Може да пожелаете да я прочетете отново.
- Ако имате допълнителни въпроси, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас и не трябва да го давате на други хора. То може да им навреди дори когато техните оплаквания са същите като Вашите.

В тази листовка:

1. Какво представлява ЗИМАКС и за какво се използва
2. Преди да започнете да приемате ЗИМАКС
3. Как трябва да се приема ЗИМАКС
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхраняване на ЗИМАКС
6. Допълнителна информация

ZMAX™ 2 г гранули с удължено освобождаване за перорална суспенсия
ЗИМАКС 2 г гранули с удължено освобождаване за перорална суспенсия
Azithromycin

Името на това лекарство е ЗИМАКС. Лекарственото вещество е azithromycin (азитромицин) като azithromycin dihydrate (азитромицин дихидрат).

Всяка бутилка съдържа 2 г от лекарственото вещество azithromycin.

Помощните вещества са: глицерол дибехенат, полоксамери, захароза, триосновен безводен натриев фосфат, магнезиев хидроксид, хидроксипропил целулоза, ксантанова гума, безводен колоиден силиций, титаниев диоксид (E171) и ароматизатори: изкуствен черешов ароматизатор и изкуствен бананов ароматизатор.

Притежател на разрешението за употреба:

PFIZER EUROPE MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, England CT13 9NJ

Производител:

Pfizer Italia S.R.L., Borgo San Michele S.S. Km. 50, Latina, Italy

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗИМАКС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ЗИМАКС се предлага под формата на бели до белезникаво-бели гранули с удължено освобождаване за перорална суспенсия. Когато е приготвен като суспенсия с вода представлява бяла течност с плодов аромат, която може да се усеща като леко гранулирана по време на пиене.

Какъв тип лекарство е ЗИМАКС

ЗИМАКС принадлежи към група лекарства, известни като макролидни антибиотици. Тези лекарства се използват за лечение на широк спектър бактериални инфекции. ЗИМАКС действа като спира растежа на бактериите, които причиняват инфекцията.

За какво се използва ЗИМАКС



ЗИМАКС може да се прилага при възрастни и деца над 12 години.

ЗИМАКС се прилага срещу чувствителни бактерии, които причиняват леки до умерено тежки състояния, както следва:

- Обострени хронични бронхити
- Синусит
- Пневмония, придобита в обществото
- Фарингит/тонзилит.

2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ЗИМАКС

Не приемайте ЗИМАКС:

▪ Ако сте алергични към azithromycin или други макролидни или кетолидни антибиотици (включително erythromycin), или някое от помощните вещества в състава на лекарството, описани по-горе.

Обърнете специално внимание при ЗИМАКС:

- Ако някога сте имали проблеми при прием на други лекарства, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.
- Ако имате непоносимост към някои захари (като галактоза, лактоза или глюкоза), кажете за това на Вашия лекуващ лекар.
- Ако приемате някое от следните лекарства, предупредете Вашия лекар или фармацевт преди да приемете ЗИМАКС: варфарин (или друго лекарство против съсирване на кръвта), терфенадин (лекарство за сенна хрема или кожна алергия), циклоспорин (прилага се за потискане на имунната система, за да се предотврати и лекува отхвърлянето от организма на трансплантиран орган или костен мозък), дигоксин (прилага се за лечение на сърдечна недостатъчност), теофилин (използува се за лечение на астма) или нелфинавир (лекарство за лечение на СПИН).

Съобщете незабавно на Вашия лекар, ако получите кожен обрив, отоци по лицето и тялото, свиркащо дишане или хрипове по време на лечението със ЗИМАКС!

Прием на ЗИМАКС с храна и напитки

Приемайте ЗИМАКС на празен стомах (най-малко 1 час преди или 2 часа след хранене).

Бременност

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да приемате ЗИМАКС, ако сте бременна или планирате забременяване.

Кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да приемате ЗИМАКС, ако кърмите.

Шофиране и работа с машини:

Няма данни, че приемането на ЗИМАКС може да повлияе върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация за някои от помощните вещества на ЗИМАКС:

ЗИМАКС съдържа 19.4 г захароза (обичайно наричана „захар“). Това трябва да се има в предвид, ако страдате от захарен диабет.

ЗИМАКС съдържа 148 мг натрий, което трябва да се има предвид, ако сте на диета с ниско съдържание на натрий.

Прием на други лекарства:



Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако в момента приемате или наскоро сте приемали каквото и да е друго лекарство, даже и без лекарско предписание.

3. КАК ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМА ЗИМАКС

Винаги приемайте ЗИМАКС точно както Вашият лекар Ви е инструктирал. Ако не сте сигурни как да приемате това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

ЗИМАКС осигурява пълен курс на лечение с еднократна доза, така че е необходимо да приемете това лекарство само веднъж.

Вашият фармацевт може да приготви суспенсията за Вас.

Ако суспенсията не е приготвена, пригответе я по следния начин:

- Отворете бутилката чрез натискане надолу и завъртане на капачката.
- Използвайки приложената мерителна чашка, внимателно измерете 30 мл вода, като напълните чашката до мерителната черта, сочеца 30 мл, след което излейте водата в бутилката.
- Повторете тази процедура така, че да добавите общо 60 мл вода в бутилката.
- Затворете капачката и разклатете добре бутилката, за да се разтворят гранулите.

За да приемете ЗИМАКС

Разклатете добре бутилката и след това отворете чрез натискане надолу и завъртане на капачката. Изпийте цялото съдържание на бутилката.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, ЗИМАКС може да причини нежелани реакции.

Най-честата нежелана реакция е диария, но други чести нежелани реакции са главоболие, гадене, болка в корема или повръщане. Тези реакции са обикновено леки до умерено тежки и изчезват след един или два дни.

Ако повърнете до 5 минути след приемането на ЗИМАКС, свържете се с Вашия лекар, тъй като може да се наложи прием на още една доза.

По-редки нежелани реакции са: астения (обща отпадналост), болка в гръдния кош, запек, замаяване, дисгеузия (промяна във вкусовите усещания), диспепсия (киселини), газове, гастрит, левкопения и неутропения (промени в броя на белите кръвни клетки), редки изпражнения, орална кандидоза (гъбична инфекция на устата), сърцебиене, сърбеж, обрив, уртикария (сърбяща и зачервена кожа), вагинит (възпаление на влагалището) или световъртеж.

Ако някоя от тези нежелани реакции се окаже трайна или обезпокоителна или ако забележите нежелана реакция, която не е спомената в тази листовка, моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗИМАКС

Съхранявайте ЗИМАКС на място, недостъпно за деца!

Съхранявайте Вашето лекарство при температура под 30°C.
Пазете опаковката плътно затворена, докато не използвате лекарството.
Използвайте готовата суспензия до 12 часа след нейното приготвяне.



Не приемайте ЗИМАКС, ако цветът на лекарството изглежда променен.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията в тази листовка се отнася само за ЗИМАКС. Тази листовка не съдържа цялата информация за това лекарство. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба за каквато и да било информация относно този лекарствен продукт.

ТП „Пфайзер НСР Корпорейшън“
София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 115А
тел. +359 2 970 4333

Дата на последна редакция на листовката:

