

Листовка за пациентата

Traumeel S

Траумил С

Ампули за перорално приложение

Хомеопатичен лекарствен продукт

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
 ДАТА 29.05.2006

Състав:

1 ампула от 2,2 мл. (=2,2г.) съдържа:

Лекарствени вещества:

Arnica montana	D2	2,2 mg
Calendula officinalis	D2	2,2 mg
Chamomilla recutita	D3	2,2 mg
Symphytum officinale	D6	2,2 mg
Achillea millefolium	D3	2,2 mg
Atropa belladonna	D2	2,2 mg
Aconitum napellus	D2	1,32 mg
Bellis perennis	D2	1,1 mg
Hypericum perforatum	D2	0,66 mg
Echinacea	D2	0,55 mg
Echinacea purpurea	D2	0,55 mg
Hamamelis virginiana	D1	0,22 mg
Mercurius solubilis	D6	1,1 mg
Hahnemann		
Hepar sulfuris	D6	2,2 mg

Помощни вещества

Дестилирана вода 2179,10 mg

Натриев хлорид 19,4 mg

Показания: Наранявания от всякакъв вид /при спортуване, злополука/ като навсяхвания, изкълчвания, натъртвания, кръвоизливи, ставни изливи, скулвания на костите и т.н., възпалителни и свързани с възпаления дегенеративни процеси на различни органи и тъкани /напр. пародонтити, гнойни венечни джобове, парадонтози/, както и на опорния и двигателния апарат /тендовагинит, бурсит, химероскалуларен периартрит/, артроза на бедрените, коленните и малките стави.

Противопоказания:

Свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки или свръхчувствителност към растенията от сем. Сложноцветни.

Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба

По принцип, поради възможна имунологична реакция след приемане на Echinacea, да се избягва при прогресиращи системни заболявания като туберколоза,



левкоцитоза, колагенни васкуларни заболявания, МС, HIV инфекции, СПИН и други автоимунни заболявания. Да не се инжектира!

Нежелани реакции:

При единични случаи може да има реакции на свръхчувствителност. След употреба може да се засили слюноотделянето. В такива случаи се консултирайте със специалист.

Лекарствени взаимодействия:

Не са известни

Дозировка и начин на приложение:

Обикновено 1 ампула се разтваря във вода и се изпива преди хранене 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – 1-3 ампули дневно.

Продуктът не е противопоказан шофьори.

При бременно и кърмачки лекарството може да се прилага само след оценка на съотношението полза/риск от лекар.

При деца до 12 год. възраст продуктът да се прилага след лекарска препоръка.

Ако след приложението на продукта не настъпи подобрене или състоянието се влоши, да се направи консултация с лекар.

Лекарствени форми и опаковки:

Картонена кутия, съдържаща 10 амп. от 2,2 мл.

Условия за съхранение:

Продуктът да се съхранява при температура под 25° на защитено от светлина място.

Продуктът да се съхранява на недостъпно за деца място!

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Производител и притежател на разрешителното за регистрация:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden

