

Листовка на лекарствения продукт**РИНГЕР БИОФАРМ инфузионен разтвор****в полипропиленов сак от 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml**

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 22.05.06

Прочетете внимателно листовката преди да започнете лечение

-Запазете листовката. Възможно е да е необходимо отново да я прочете.

-При въпроси обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

-Лекарственият продукт е предписан на Вас.

В тази листовка

1. Какво представлява РИНГЕР БИОФАРМ инфузионен разтвор
2. Преди да се започне лечение с РИНГЕР БИОФАРМ инфузионен разтвор
3. Как се прилага РИНГЕР БИОФАРМ инфузионен разтвор
4. Възможни нежелани лекарствени реакции при лечение с РИНГЕР БИОФАРМ инфузионен разтвор
5. Условия на съхранение на РИНГЕР БИОФАРМ инфузионен разтвор
6. Допълнителна информация.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА:

1000 ml от инфузионния разтвор съдържа:

Sodium chloride 8,6 g/l,

Potassium chloride 0,3 g/l,

Calcium chloride 0,33 g/l,

което отговаря на:

Na⁺ 147,2 mmol/l,K⁺ 4,02 mmol/l,Ca⁺⁺ 2,25 mmol/l,

Cl⁻ 155,7 mmol/l);

pH: 5,0-7,0;

теоретичен осмоларитет: около 309 mOsm/l

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА:

Water for injections–Вода за инжекции

1. КАКВО ПРЕСТАВЛЯВА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР RINGER BIOPHARM И ЗА КАКВО СЕ УПОТРЕБЯВА?

Лекарственият продукт се прилага за лечение на състояния, свързани с хиповолемиа (загуба на течности). Обемът на интравенозните вливания се определя от лекуващия лекар.

2. ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР RINGER BIOPHARM

Преди употребата на **ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР RINGER BIOPHARM** съобщете, ако:

-сте хиперсензитивни (алергични) към някое от лекарствените или помощните вещества.

Лекарственият продукт не се прилага в случай на:

- тежка бъбречна недостатъчност
- хиперхидратационни състояния (състояние с повишено количество течност в организма)
- състояния, изискващи намален внос на натрий

Взаимодействия с храна и напитки

Лекарственият продукт се прилага интравенозно, по лекарско предписание.

Бременност

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употреба на лекарствени продукти.

Кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употреба на лекарствени продукти.

Шофиране и работа с машини



Няма данни лекарственият продукт да повлиява способността за работа с машини и дейности, свързани с шофиране.

Прием на други лекарствени продукти

Моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или до скоро сте приемали други лекарствени продукти.

3. КАК СЕ УПОТРЕБЯВА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР RINGER BIOPHARM?

Ако сте приели по-голяма от предписаната доза РАЗТВОР RINGER BIOPHARM:

Лекарственият продукт се прилага по лекарско предписание

Ако сте пропуснали прием на РАЗТВОР RINGER BIOPHARM:

Лечението с лекарствения продукт се контролира от медицински персонал

При спиране на лечението с РАЗТВОР RINGER BIOPHARM:

Лечението се контролира от медицински персонал

4. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

БИОФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ АД, БУЛ. ТРАКИЯ №75, 8800 СЛИВЕН

5. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Както при всички лекарствени продукти прилагането на **ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР RINGER BIOPHARM** може да доведе до нежелани лекарствени реакции. При правилна употреба на инфузионния разтвор практически не се отбелязват нежелани лекарствени реакции. Ако установите нежелани лекарствени реакции, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

6. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

При температура под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. СРОК НА ГОДНОСТ

2 (две) години след датата на производство.



БИОФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ АД гр. Сливен	RINGER BIOPHARM инфузионен разтвор
--	--

Да не се прилага след посочения срок.

8. ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА

