

STERILISED WATER FOR INJECTIONS
sol.inj. 1 ml; 2 ml; 5 ml; 10 ml

Информация за пациента
Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете лечение. Тя съдържа кратка информация относно Вашето лекарство. Ако не разбирате нещо или имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекуващ лекар.

СТЕРИЛИЗИРАНА ВОДА ЗА ИНЖЕКЦИИ
STERILISED WATER FOR INJECTIONS**ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА**

Разтворител за парентерална употреба.

В една ампула от безцветно стъкло се съдържа стерилизирана вода за инжекции 1 ml, 2 ml, 5 ml или 10 ml, по 5 или 10 ампули в блистер от твърдо ПВХ фолио.

Ампули по 1 и 2 ml: по 10 броя в блистер, по 1 блистер в опаковка.

Ампули по 5 ml: по 10 броя в блистер, по 1 или 5 блистера в опаковка.

Ампули по 10 ml: по 5 броя в блистер, по 1 или 10 блистера в опаковка.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА И ПРОИЗВОДИТЕЛ
СОФАРМА АД

София 1220, ул. "Илиенско шосе" 16, България

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СТЕРИЛИЗИРАНАТА ВОДА ЗА ИНЖЕКЦИИ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Стерилизираната вода за инжекции не е лекарство. Тя се използва като разтворител на лекарствени продукти за приготвяне на разтвори за инжекционна употреба.

КОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА СТЕРИЛИЗИРАНА ВОДА ЗА ИНЖЕКЦИИ

Стерилизираната вода за инжекции не трябва да се прилага парентерално самостоятелно.

Да се съобразява с противопоказанията за приложение на разтвореното лекарствено средство.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Стерилизираната вода за инжекции да се използва за приготвяне на разтвори съгласно указанията за конкретния лекарствен продукт.

Да не се прилага за интравенозна инфузия, ако полученият разтвор не е изотоничен по отношение на плазмата.

Преди използване, ампулата с вода да се провери за наличие на видими частици или помътняване.

При приготвяне на инфузионния разтвор да се работи при строго спазване на асептичност.

Разтворът да се прилага незабавно.

Бременност и кърмене

Приложението в този период зависи от лекарствения продукт, който е разтворен в стерилизираната вода за инжекции.



STERILISED WATER FOR INJECTIONS
sol.inj. 1 ml; 2 ml; 5 ml; 10 ml

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Не оказва влияние.

**КАКВИ ЛЕКАРСТВА МОЖЕ ДА ВЗАИМОДЕЙСТВАТ СЪС
СТЕРИЛИЗИРАНАТА ВОДА ЗА ИНЖЕКЦИИ?**

Няма данни за неблагоприятни лекарствени взаимодействия.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

Използва се в нужното според случая количество като разтворител на лекарствен продукт за инжекционно приложение.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Самостоятелното интравенозно приложение на стерилизирана вода или на подгovenия с нея хипотоничен разтвор може да педизвика хемолиза на еритроцитите.

СЪХРАНЕНИЕ

В оригиналната опаковка, при температура под 25°C. Да не се замразява!

Да не се използва след датата на изтичане срока на годност, отбелязана върху опаковката.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

По лекарско предписание.

Тази листовка е редактирана за последен път на 1.12.2006 г

