

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА



Моля прочетете цялата листовка внимателно, преди да започнете да приемате лекарството.

- Пазете листовката, защото може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично за Вас. Не го давайте на други лица, защото може да им навреди, дори ако имат същите симптоми като Вашите.

Съдържание на листовката

1. Какво представлява Верогалид ER 240 mg и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди употребата на Верогалид ER 240 mg
3. Как да използвате Верогалид ER 240 mg
4. Възможни нежелани лекарствни реакции
5. Как да съхранявате Верогалид ER 240 mg
6. Допълнителна информация

Verogalid® ER 240 mg prolonged-release tablets (Verapamil hydrochloride)

Верогалид ER 240 mg таблетки с удължено освобождаване
Верапамил хидрохлорид

Състав

Лекарствено вещество: Verapamil hydrochloride 240 mg в 1 таблетка с удължено освобождаване.

Помощни вещества: натриев алгинат, микрокристална целулоза, повидон, магнезиев стеарат, оцветител YS-1-7006 (чист), оцветител Y-5-12577 (жълт).

Таблетки с удължено освобождаване – флакони x 30, x 100.

Блистери с 10 таблетки x 1, x 3.

Производител и Притежател на Разрешението за Употреба

IVAX Pharmacaeuticals s.r.o., Ostravska 29, 747 70 Opava-Komárov, Czech Republic

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВЕРОГАЛИД ER 240 mg И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Верапамил хидрохлорид ограничава навлизането на калция в клетките на съдовата гладка мускулатура на артериите и в клетките на миокарда. Той действа още върху проводната система на сърцето. Благодарение на тези свои ефекти верапамилът се използва за предотвратяване на пристъпи на стенокардия, при нарушения на сърдечния ритъм и в случай на високо кръвно налягане. Лекарствената форма позволява бавно освобождаване на лекарственото вещество, което води до по-рядко приемане на дозата на продукта.



Лекарственият продукт се използва за лечение на възрастни с високо кръвно налягане (хипертония) и за дългосрочна терапия и превенция на пристъпите на ангина пекторис, както и за нормализиране на сърдечния ритъм или за намаляване на сърдечната честота в случай на ускорена камерна честота и предсърдно мъждене.

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА ВЕРОГАЛИД ER 240 mg

Не употребявайте Верогалид 240 mg ако:

- имате тежки нарушения на функцията на лявата сърдечна камера;
- имате ниско кръвно налягане (систолично налягане под 90 mmHg);
- имате забавен пулс (пулс под 50 удара/мин. преди започване на лечението);
- имате усложнен миокарден инфаркт;
- имате синдрома на болния синусов възел;
- имате тежки нарушения от II и III степен на провеждането на импулсите от предсърдията към камерите на сърцето (синаатриален AV блок II и III степен);
- ако сте алергични към лекарственото вещество, или някое от помощните вещества;
- ако сте бременна и особено през първото тримесечие.
- ако кърмите. Кърменето трябва да се преустанови по време на употребата на Верогалид ER 240 mg.

Продуктът не трябва да се прилага при деца и младежи под 18 годишна възраст.

Приемайте Верогалид ER 240 mg с повишено внимание, ако:

- страдате от чернодробно заболяване. В такъв случай приемайте лекарството само при наличие на много сериозни показания.

Прием на Верогалид ER 240 mg с храни и напитки

Не е препоръчително приемането на мазни храни по време на приема на лекарството.

Бременност

Верогалид ER 240 mg не трябва да се приема по време на бременност, особено през първото тримесечие.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Кърмене

Тъй като верапамил преминава в кърмата, кърменето трябва да се преустанови по време на употребата на Верогалид ER 240 mg.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Верогалид ER 240 mg може особено в началото на лечението, да доведе до виене на свят и умора, които неблагоприятно да повлияят дейности, изискващи повишено внимание, координиране на движенията и вземането на бързи решения (напр. шофиране на моторни превозни средства, работа с машини, работа на високи места и др.). Тези дейности могат да се извършват само със съгласието на Вашия лекар.



Прием на други лекарства

Ефектите на Верогалид ER 240 mg и на други, едновременно приемани лекарства може да си взаимодействат. Затова, информирайте Вашия лекар за всички лекарства, отпускани по лекарско предписание или без рецепта, които вземате в момента или ще вземате. Ако някой друг лекар Ви предпише или препоръча друго лекарство, информирайте го, че вече вземате Верогалид ER 240 mg. Преди да започнете да вземате друго лекарство, отпускано без рецепта, едновременно с Верогалид ER 240 mg е необходимо да се посъветвате с Вашия лекар. Ако приемате верапамил едновременно с антихипертензивни средства (лекарства понижавачи високото кръвно налягане), антиаритмични средства и някои анестетици може да се наблюдава продължително понижаване на кръвното налягане и нарушения на сърдечната функция. Интравенозни Бета-блокери (използвани за лечение на сърдечни заболявания) не трябва да се прилагат на пациенти лекувани с верапамил, поради удължаване на времето на провеждане на импулсите от предсърдията до камерите на сърцето, което може да доведе до изразено понижаване на кръвното налягане, забавяне на пулса и сърдечна недостатъчност. Леко повишение на нивата на дигоксина може да се наблюдава при едновременно лечение с дигоксин, което обикновено няма клинично значение. Ако има някакви признаци на дигиталисова токсичност (затруднено храносмилане, нарушения на цветното виждане, изразено сърцебиене) е необходимо да потърсите незабавно лекарска помощ.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако напоследък сте приемали каквото и да е друго лекарство, дори отпускано без рецепта.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ВЕРОГАЛИД ER 240 mg

Точната дозировка трябва да бъде определяна винаги от лекар.

Високо кръвно налягане

Лечението обикновено започва с прилагане на доза от 1 таблетка с удължено освобождаване Верогалид ER 240 mg сутрин по време на хранене. По ниска начална доза от 1/2 таблетка (120 mg) Верогалид ER 240 mg се прилага при пациенти с ниско телесно тегло и при пациенти с чернодробни нарушения. При тези пациенти постепенното понижаване на кръвното налягане е особено желателно. Ефектът на продукта се наблюдава 1 седмица след започване на лечението. Ако не се постигне желателния ефект след този период, дозите може да се повишат от Вашия лекар до 2 таблетки, като втората се приема след 12 часа.

Нарушения на сърдечния ритъм и стенокардия

Използва се същата дозировка, както в случаите на високо кръвно налягане. След консултация с лекар, може да се приеме по-висока доза при исхемия на миокарда, по време на най-изявената симптоматика, предимно сутрин.

Общата дневна доза от 480 mg не трябва да се надвишава.


Таблетките се гълтат цели, по време на хранене с малко количество течност.

Ако смятате, че ефектът на Верогалид ER 240 mg е твърде силен или твърде слаб, моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте взели повече от предписаната доза Верогалид ER 240 mg

Ако сте взели повече от предписаната доза Верогалид ER 240 mg, незабавно се обърнете към Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да вземете Верогалид ER 240 mg



Ако някога забравите да вземете лекарството, вземете го веднага след като си спомните, след това продължете да го вземате в обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Както всяко лекарство, Верогалид ER 240 mg може да има нежелани реакции. Продуктът се понася обикновено добре, но въпреки това е възможно да се наблюдават следните нежелани реакции: главоболие, виене на свят, мравучкане, треперене, сърцебиене, чувство на неразположение, ниско кръвно налягане, забавен пулс, нарушения в проводимостта на сърцето (сърдечен блок), сърдечна недостатъчност, умора, затруднено дишане, изпотяване, кожни обриви, сърбеж, зачервяване на кожата, топли вълни, мускулна слабост, мускулни болки, умора, гинекомастия (ненормално увеличение на млечните жлези при мъжете), галакторея (патологично, обилно или спонтанно изтичане на мляко от гърдните жлези), повишени чернодробни ензими, нарушено усвояване на кръвната захар, хиперпролактинемия (повишени нива на пролактин), гадене, повръщане, запек, който може да бъде проблем главно при по-възрастни пациенти, илеус (нарушение в преминаването на чревното съдържимо), коремна болка.

Вашият лекар трябва да бъде информиран за появата на тези нежелани лекарствени реакции или на други необичайни реакции.

Ако забележите нежелани реакции, които не са упоменати в тази листовка, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВЕРОГАЛИД ER 240 mg

Да се съхранява при температура под 30°C. Затваряйте плътно контейнера, за да предпазите лекарството от влага.

Таблетките трябва да се изваждат от блистера непосредствено преди употреба. Съхранявайте Верогалид ER 240 mg на недостъпно за деца място.

Не използвайте Верогалид ER 240 mg след срока на годност, обозначен върху опаковката.

Опаковки

Флакони x 30, 100 таблетки.

Блистери с 10 таблетки по 1, по 3 броя.

6. Допълнителна информация

Дата на последна редакция на текста – Ноември 2006 г.

