


Уважаеми пациенти,

Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекуващ лекар или фармацевт.

Наименование на лекарствения продукт:

Clotromazol HEXAL®

/Клотримазол ХЕКСАЛ®/



Кое е активното вещество?

1 g крем съдържа 10 mg Clotrimazole.

Какво друго съдържа Clotromazol HEXAL® крем?

Бензилов алкохол, цетилпалмитат, цетилстеарилов алкохол, течен парафин, полисорбат 60, сорбитан стеарат, пречистена вода.

Лекарствена форма и съдържание:

Оригинална опаковка, съдържаща 25 g и 50 g крем.

Кой е отговорен за продажбата на Clotromazol HEXAL® крем?

Hexal AG

Industriestrasse 25, 83607 Holzkirchen, Germany

Tel.: 08024/908-0; Fax: 08024/908 1290

Кой е отговорен за производството на Clotromazol HEXAL® крем?

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1; D-39179 Barleben, Germany

Tel.: 0049 39203 71-0; Fax: 0049 39203 71 777

Какво представлява Clotromazol HEXAL® крем?

Лекарствен продукт, прилаган при гъбични инфекции на кожата.

За какво се използва Clotromazol HEXAL® крем?

Гъбични инфекции (микози) на кожата, причинени от дерматофити, гъбички (напр. *Candida species*), плесени и други като *Malassezia furfur* и инфекции, причинени от *Corynebacterium minutissimum*.

Такива могат да бъдат: микози по ходилата, кожата и кожните гънки, повърхностни кандидози, *Pityriasis versicolor*, еритразма

Кога не трябва да приемате Clotromazol HEXAL® крем?

Вие не трябва да прилагате Clotromazol HEXAL®, ако страдате от свръхчувствителност към активната субстанция clotrimazole или към някои от помощните вещества.

При известна свръхчувствителност към цетилстеарилов алкохол се препоръчва вместо крем да се прилагат други лекарствени форми, които не съдържат цетилстеарилов алкохол (напр. разтвор).

Какви специални предпазни мерки трябва да се вземат?

Няма такива



Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Clotromazol HEXAL® крем или могат да бъдат повлияни от продукта?

Clotrimazol HEXAL® понижава ефикасността на други противогъбични лекарствени продукти (amphotericin и други полиенови антибиотици като nystatin и natamycin).

Поради съдържанието на парафин, едновременното приложение на Clotromazol HEXAL® и латексови презервативи може да доведе до риск от скъсване на презерватива. Поради тази причина трябва да се предприемат други контрацептивни мерки по време на лечението.

Моля, обърнете внимание, че тази информация може да се отнася и за наскоро приемани лекарствени продукти.

Какви специални предпазни мерки трябва да се вземат по време на бременност и кърмене?

Като предпазна мярка Clotromazol HEXAL® не трябва да се прилага през първите месеци на бременността.

Дозировка, начин и продължителност на приложение:

Ако няма друго предписание на продукта от Вашия лекар, се препоръчват следните дозировки. Моля, придържайте се към указанията за употреба, тъй като в противен случай Clotromazol HEXAL® крем няма да действа правилно.

В каква доза и колко често можете да приемате Clotromazol HEXAL® крем?

Clotromazol HEXAL® крем се нанася на тъък слой върху засегнатия участък от кожата 2-3 пъти дневно.

Малко количество от крема (около ½ cm от крема) е достатъчно ефективно за област с големина на длан.

Кога и как можете да приемате Clotromazol HEXAL® крем?

Кремът трябва да се втрива внимателно в кожата.

При лечение на гъбички по ходилата след всяко измиване трябва добре да се подсушават краката (особено между пръстите).

Колко дълго можете да прилагате Clotromazol HEXAL® крем?

Продължителността на лечение е различна в зависимост от вида на инфекцията. Редовното и достатъчно продължително приложение на крема е важно за успеха на лечението.

За да се постигне пълно оздравяване, трябва да продължите лечението най-малко 4 седмици, дори след отшумяване на симптомите на остро възпаление или оплакванията.

Pityriasis versicolor обикновено се лекува за 1-3 седмици и еритразма за 2-4 седмици.

При гъбички по ходилата лечението трябва да продължи до 2 седмици след отшумяване на симптомите.

Какво трябва да знаете, ако сте прекъснали лечението или сте го прекратили преждевременно?

Гъбичната инфекция може отново да се разпространи или повторно да се появи (рецидивира), ако не се лекува достатъчно продължително време.



Какви нежелани реакции може да предизвика приложението на Clotrimazol HEXAL® крем?

Не често може да се наблюдава кожно раздразнение (напр. преходно зачервяване, парене, щипене).

Могат да се наблюдават алергични реакции при свръхчувствителност към цетилстеарилов алкохол.

Ако наблюдавате нежелани лекарствени реакции, които не са описани в тази листовка, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Какви мерки трябва да бъдат взети във връзка с нежеланите лекарствени реакции?

Оплаквания като сърбеж отшумяват след кратко време.

Инструкции за употреба:

Няма

Инструкции за съхранение:

Срокът на годност на лекарствения продукт е напечатан върху опаковката.

Да не се употребява след изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката.

Clotrimazol HEXAL® крем е стабилен 6 месеца след отваряне на опаковката.

Как трябва да се съхранява Clotrimazol HEXAL® крем?

Да се съхранява на недостъпни за деца места!

Дата на последна редакция на листовката:

Юли 2004

Важно е да подържате ежедневно личната хигиена, но да се въздържате напр. от много чести горещи вани с парфюмизирани соли за вана. Използвайте много вода и меки сапуни. Подсушавайте кожата добре, особено кожните гънки и между пръстите на ръцете и краката, тъй като там съществуват условия, предразполагащи развитието на гъбички. Ежедневно сменяйте кърпите за лице, хавлиите и бельото, които трябва да бъдат изработени от естествени материали.

