

ИАЛ
ОДОБРЕН
ДА 19.12.2016

Информация за пациента. Моля прочетете внимателно!

FUCIDIN® H
cream

ФУСИДИН® Н
крем

Състав

Лекарствени вещества:

Fusidic acid 20 mg/g

Hydrocortisone acetate 10 mg/g

Помощни вещества:

Бутилхидроксианизол, цетилов алкохол, глицерол 85%, течен парафин, полисорбат 60, калиев сорбат, бял мек парафин, хлороводородна киселина и пречистена вода.

Действие

Фусидин® Н крем съчетава антибактериалното действие на фусидовата киселина с противовъзпалителния ефект на хидрокортизон ацетата.

Показания

Фусидин® Н крем се прилага за лечение на дерматит, включително атопичен и контактен дерматит, където е доказана или има съмнения за инфекция, причинена от микроорганизми чувствителни на фусидовата киселина.

Дозировка

Кремът се прилага 3 пъти дневно не повече от 2 седмици.

Противопоказания

Установена свръхчувствителност към някоя от съставките на Фусидин® Н крем.

Поради наличието на кортикостероидна съставка, Фусидин® Н крем е противопоказан при следните състояния: първични кожни инфекции причинени от бактерии, гъбички или вируси (като херпес или варицела), кожни прояви свързани с туберкулоза или сифилис, периодичен дерматит или варицела.

Нежелани лекарствени реакции

Най-често наблюдаваните нежелани реакции на Fucidin® Н крем са различни симптоми на дразнене в мястото на приложение. Наблюдавани са и алергични реакции.

Въз основа на клиничните данни за Fucidin® Н крем при около 5% от пациентите може да се очаква появата на нежелани реакции. Най-често наблюдаваните нежелани реакции бяха: сърбеж, обрив и дразнене на кожата, влошаване на екзема, преходно чувство на смъдене и парене.

Въпреки, че те не са наблюдавани при клиничните проучвания с Fucidin® Н крем, локалната употреба на кортикоステроиди може да доведе до изтъняване на кожата, разширение на малките кръвоносни съдове под кожата или белези по кожата от разтягане, особено при продължително прилагане.

Макар и рядко могат да се наблюдават както при всички други кортикостероиди възпаление на космените фоликули, усилен растеж на косми, обрив на кожата около устата, контактна алергия, бели петна по кожата и системен ефект върху организма.



Взаимодействия

Не са известни.

Предпазни мерки

Трябва да се избягва продължителното кортикостероидно лечение, особено при кърмачета и деца.

Употребата на Fucidin® Н крем трябва да се избягва при следните състояния: атрофична кожа, язви на кожата, обикновено акне, "чупливост" на вените на кожата, перианален и генитален сърбеж.

Трябва да се избягва още контакт с отворени рани и лигавици.

Фусидин® Н крем съдържа бутилхидроксианизол, цетилов алкохол и калиев сорбат, които могат да предизвикат локални кожни реакции (напр. контактен дерматит). Бутилхидроксианизолът може да предизвика още дразнене на очите и лигавиците.

Бременност и кърмене

Fucidin® Н крем не трябва да се използва по време на бременност или кърмене, освен при ясна необходимост.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Fucidin® Н не повлиява или незначително повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Предозиране

Не се наблюдава.

Срок на годност

Да не се използва след изтичане срока на годност обозначен на опаковката.

Срок на годност след отваряне на опаковката: 3 месеца

Съхранение

Няма специални условия.

Предупреждения

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Опаковка

Туби по 15 g

Производител и притежател на разрешението за употреба

LEO Pharmaceutical Products Ltd. A/S
Ballerup - Denmark

Дата на редакция на текста

02/2006
BG12/2006

