

COLDREX* Junior Hot Drink
КОЛДРЕКС* Джуниър Хот Дринк



Какво трябва да знаете за COLDREX Junior Hot Drink?

Моля прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да давате този продукт, особено частта, озаглавена "Проверете преди да приемете това лекарство". Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Запазете листовката, може да поискате да я прочетете отново.

Какво има в опаковката?

COLDREX Junior Hot Drink.
Опаковката съдържа 5 или 10 сашета.

Какво съдържа COLDREX Junior Hot Drink?

Всяко саше от 3g съдържа paracetamol 300 mg, ascorbic acid (Vitamin C) 20mg и phenylephrine hydrochloride 5 mg.

Сашето съдържа също така и помощните вещества захарин-натрий, натриев цикламат, лимонена киселина, натриев цитрат, царевично нишесте, захароза, лимонена есенция, оцветител и куркумин (E100) и колоиден безводен силициев диоксид. Съдържание на натрий в едно саше – 0,055g.

Кой произвежда COLDREX Junior Hot Drink?

Притежател на разрешението за употреба е:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
GlaxoSmithKline Export Ltd.
Brentford, TW8 9GS, UK

Производител за GlaxoSmithKline Consumer Healthcare е:
SmithKline Beecham S.A.
Alcala, Spain

Как действа COLDREX Junior Hot Drink?

Парацетамол е аналгетик (болкоуспокояващо средство) и антипиретик (понижава температурата). Аскорбиновата киселина (витамин С) е основна съставка в продуктите срещу настинка и грип. Включва се, за да помогне на организма да възстанови количеството витамин С, което може да намалее в началните стадии на настинка и грип. Фенилефрин хидрохлорид е симпатикомиметичен деконгестант, който отпушва носа и синусите, помагайки Ви да дишате по-леко.

За какво е показан COLDREX Junior Hot Drink?

COLDREX Junior Hot Drink е показан за облекчаване на основните симптоми при настинка и грип под формата на топла напитка с вкус на лимон при деца на и над 6 годишна възраст. При първите симптоми на настинка или грип, дайте на Вашето дете Coldrex Junior Hot Drink за повлияване на високата температура, главоболие, мускулни болки, запушен нос, възпалено гърло и болезнени синуси.

Проверете преди да дадете това лекарство.

ВАЖНО!

Запомнете: COLDREX Junior Hot Drink съдържа парацетамол. Не давайте с други продукти, съдържащи парацетамол. COLDREX Junior Hot Drink съдържа деконгестант. Да не се приема с други продукти за облекчаване на грип, настинка или запушване на носа и синусите.

Ако Ви е известно, че детето има непоносимост към някои захари, уведомете Вашия лекар, преди да дадете това лекарство.



Не давайте COLDREX Junior Hot Drink, ако:

- Детето Ви е алергично към парацетамол, аскорбинова киселина, фенилефрин хидрохлорид или към някоя от съставките, посочени по-горе.
- Детето Ви приема лекарства, предписани от Вашия лекар или лечебно заведение за депресия (включително инхибитори на моноаминоксидазата, също известни като MAOI's).

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да дадете това лекарство, ако:

- детето Ви има проблеми с бъбреците или чения дроб, хиперактивна тироидна (щитовидна) жлеза, диабет или е под лекарско наблюдение за високо кръвно налягане или сърдечно заболяване (включително при употреба на бета-блокери и антикоагуланти, напр. warfarin).
- симптомите се влошат или запазят (температура повече от 3 дни, болки повече от 5 дни).

Как трябва да се приема COLDREX Junior Hot Drink?

Съдържанието на едно саше трябва да се изсипе в чаша за вода. Напълва се с топла вода (около 125 мл.). Разбърква се добре. При необходимост може да се добави студена вода и захар или мед по желание.

Деца от 6 – 12 години:

По едно саше на всеки четири часа при необходимост.

Да не се приемат повече от 6 сашета за 24 часа.

Да не се дава на деца под 6 години освен по лекарско предписание.

Какво трябва да направите, ако приемете прекалено много?

Приемането на повече от дозата, препоръчана на опаковката или в листовката може да навреди. В случай на предозиране е необходимо веднага да потърсите лекарска помощ, дори и, ако детето изглежда или се чувства добре, тъй като забавянето може да доведе до сериозно чернодробно увреждане.

Какви нежелани реакции биха могли да се наблюдават при COLDREX Junior Hot Drink?

Обикновено, при употреба в препоръчаните дози, съставките на COLDREX Junior Hot Drink се приемат добре. Въпреки това, рядко могат да се наблюдават кожен обрив или други алергични реакции при парацетамол. Съществуват малко съобщения за повишено кръвно налягане, главоболие, замаяност, стомашен дискомфорт (гадене и диария), нарушен сън и палпитация при фенилефрин. Тези ефекти отшумяват, ако лекарствения продукт спре да се взима.

Ако сте загрижени за тези или други реакции, докато приемате COLDREX Junior Hot Drink, спрете да давате лекарството и се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

Как да съхранявате COLDREX Junior Hot Drink?

Да се съхранява при температура под 25°C.

Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

Запомнете: Съхранявайте всички лекарства на места, недостъпни за деца.

Листовката е подготвена Януари 2006.

GSK logo

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd.,
Brentford, TW8 9GS, UK

Coldrex* е търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

