


SINEMET CR^{®†}
(carbidopa and levodopa, MSD)
таблетки 50/200 mg



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Прочетете внимателно тази листовка, преди да започнете да взимате лекарствения продукт дори ако го използвате от дълго време. Може би част от информацията от предишните листовки е променена.

Запомнете, че лекарят е предписал този лекарствен продукт само на Вас. Не го давайте на никой друг.

Какво представлява SINEMET CR?

SINEMET CR (carbidopa, levodopa, MSD) е таблетка, която съдържа две активни субстанции - карбидопа и левадопа в съотношение 50/200 мг.

SINEMET CR съдържа, освен това и следните неактивни съставки: червен железен окис, оцветител Quinoline yellow, хидроксипропил-целулоза, полимер на поливинил-ацетат-кртоновата киселина, магнезиев стеарат.

SINEMET CR се предлага в опаковка от 100 таблетки.

SINEMET CR е лекарствен продукт, който комбинира ароматната аминокиселина карбидопа - декарбоксилазен инхибитор с левадопа, метаболитен прекурсор на допамина, в таблетка с контролирано освобождаване на активното вещество. Той е предназначен за лечение на симптомите на Паркинсоновата болест.

Притежател на разрешението за употреба:

МЕРК ШАРП И ДОУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
 София – България

Производител:

Merck Sharp & Dohme B.V.,
 Харлем - Холандия

Защо моят лекар ми е предписал SINEMET CR?

Лекарят Ви е предписал SINEMET CR за лечение на симптомите на Паркинсоновата болест.

[†] Запазена марка на MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.



Паркинсоновата болест е хронично заболяване, характеризиращо се със забавени и неустойчиви движения, мускулна скованост и тремор. Ако не се лекува, Паркинсоновата болест може да затрудни ежедневната Ви дейност.

Как действа SINEMET CR при лечението на Паркинсоновата болест?

Таблетките SINEMET CR освобождават бавно двете активни съставки, левадопа и карбидопа.

Смята се, че симптомите на Паркинсоновата болест се дължат на недостига на допамин, химическо вещество, нормално произвеждано от определен клас нервни клетки. Допаминът препредава сигнали до онези части на мозъка, осъществяващи контрола върху мускулните движения. Така намаленото производство на допамин води до затруднение в движенията.

Левадопа възстановява нормалното количество допамин в мозъка, докато карбидопа осигурява доставянето на необходимото количество левадопа, където е необходимо. При повечето пациенти, това води до подобрене в симптомите на Паркинсоновата болест. Лекарствената форма за контролирано освобождаване поддържа постоянно количество левадопа във Вашия организъм.

Какво трябва да знам, преди да започна да взимам SINEMET CR?

Кой не трябва да се лекува със SINEMET CR?

Не започвайте лечение със SINEMET CR, ако:

- сте алергичен към някоя от съставките му
- имате съмнителни кожни промени (бенки), които не са прегледани от лекар или сте били болен от кожен рак
- сте лекувани за депресия с MAO-инхибитори
- имате тясноъгълна глаукома

Какво трябва да кажа на моя лекар, преди да започна лечение със SINEMET CR?

Уведомете Вашия лекар, ако имате или сте имали някакви здравни проблеми: алергии, депресии или психически смущения, белодробни, бъбречни, чернодробни, сърдечни или хормонални заболявания, язва, гърчове или глаукома.

Уведомете лекаря, ако сте били лекувани с левадопа.

Какво още трябва да знам, когато взимам SINEMET CR?



По време на лечението със SINEMET CR, бъдете особено внимателни, когато шофирате или работите с машини. Ако почувствате повишена сънливост или дори внезапни епизоди на заспиване, въздържайте се от шофиране и работа с машини, и се свържете с Вашия лекар.

Употреба при деца.

SINEMET CR не се препоръчва при пациенти под 18 годишна възраст.

Употреба при бременност и кърмене.

Не е ясно точно какъв е ефектът на SINEMET CR върху бременността. Levodopa, една от съставките на SINEMET CR, преминава в човешкото мляко. Ако сте бременна или възнамерявате да забременеете, или кърмите, уведомете Вашия лекар преди да започнете лечение със SINEMET CR. Той ще прецени ползата от препаратата и възможния риск.

Мога ли да взимам SINEMET CR едновременно с други лекарства?

Макар че SINEMET CR може да се дава с други лекарствени продукти, има и изключения. Вашият лекар може да Ви предупреди за несъвместимост с някои лекарствени продукти, използвани за лечение на психически заболявания и депресии, желязо и желязни добавки, туберкулоза, високо кръвно налягане, мускулни спазми и гърчове.

Вашият лекар и фармацевт имат по-подробна информация за лекарствените продукти, които трябва да избягвате при лечение със SINEMET CR. Уведомете Вашия лекар за всички лекарства, които взимате или имате намерение да взимате, включително и за тези, закупени без рецепта.

Мога ли да шофирам или да работя с машини по време на лечение със SINEMET CR?

Индивидуалният отговор спрямо лекарствения продукт може да варира. Някои нежелани ефекти, които са докладвани за SINEMET CR могат да засегнат способността на някои пациенти да шофират или да управляват машини. (Виж **Какви нежелани ефекти може да има SINEMET CR?**)

SINEMET CR може да предизвика сънливост и внезапни епизоди на заспиване. Поради това избягвайте да шофирате или да се занимавате с дейности, при които намаленото внимание може да изложи Вас или други хора на риск от нараняване или смърт (например работа с машини), докато подобни повтарящи се епизоди и сънливостта бъдат овладени.

Как трябва да взимам SINEMET CR?



Дозировката на SINEMET CR може да е различна и лекарят ще я определи, в зависимост от стадия на заболяването и Вашата поносимост към лечението.

Таблетките SINEMET CR 50/200 могат да се разчупват на половина, ако така е предписано. За бавното и постепенно освобождаване на активните съставки на продукта, не стривайте и не дъвчете таблетките.

За най-добър резултат, взимайте SINEMET CR всеки ден. Много е важно да спазвате препоръките на Вашия лекар за това кога и по колко от продукта да взимате.

Уведомете своевременно лекаря за всички промени във Вашето състояние, особено ако имате гадене или аномални движения, тъй като това може да наложи промени във Вашето предписание.

Какво трябва да направя в случай на предозирание?

Ако сгрешите и вземете много таблетки, незабавно се свържете с Вашия лекар, за да Ви се окаже своевременно квалифицирана медицинска помощ.

Какво трябва да направя, ако пропусна една доза?

Старайте се да взимате SINEMET CR така, както Ви е предписал лекарят. Ако обаче пропуснете да вземете една доза, не взимайте допълнителна доза. Просто вземете следващата таблетка, както обикновено.

Какви симптоми мога да очаквам при спирането на SINEMET CR?


Не спирайте лечението със SINEMET CR и не понижавайте дозата, без да се консултирате с лекар. Това може да доведе до поява на мускулна скованост, висока температура и психически промени.

Какви нежелани ефекти може да има SINEMET CR?

SINEMET CR обикновено се понася добре. Както всеки медикамент обаче, SINEMET CR може да има непредвидени или нежелани реакции, така наречените странични ефекти.

Най-честите нежелани реакции са аномални движения, като тикове и спазми (които могат да наподобяват симптомите на Паркинсоновата болест или да са различни), гадене, халюцинации, обърканост, замаяване и сухота в устата.

Други възможни нежелани реакции са: трудно заспиване и особени сънища, сънливост, внезапни епизоди на заспиване, психически промени, потиснатост, слабост, повръщане и загуба на апетит, увеличено сексуално желание, зачервяване,



загуба на коса, промяна в цвета на урината, изпотяване и/или повишено слюноотделяне и влечение към хазарт.

Могат да настъпят реакции на свръхчувствителност, като копривна треска, сърбеж, обрив и подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото, което може да причини затруднения при дишане и преглъщане: свържете се незабавно с Вашия лекар, ако настъпят подобни симптоми.

Обърнете се към Вашия лекар или фармацевт за повече информация относно нежеланите ефекти. Някои от тях могат да се окажат и с по-сериозни последици. Незабавно уведомете Вашия лекар, ако са се появили такива или други необичайни симптоми.

Как мога да науча нещо повече за SINEMET CR?

Ако след прочитането на тази листовка все още имате някакви въпроси или не сте достатъчно сигурен за нещо, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, които разполагат с много по-подробна информация за този препарат.

Какъв срок на годност има моето лекарство?

Не използвайте този лекарствен продукт по-късно от датата, посочена с четири цифри след EX (или EXP) върху опаковката. Първите две цифри означават месеца; последните две цифри - годината.

Как трябва да съхранявам SINEMET CR?

SINEMET CR трябва да се съхранява на сухо и защитено от светлина място, при температура под 30° C. Съхранявайте SINEMET CR в оригиналната му опаковка и пазете шишето плътно затворено.

Съхранявайте SINEMET CR и всички лекарства на място недостъпно за деца.

Кога за последен път е осъвременена тази брошура?

За последен път тази брошура е осъвременена през месец юли 2006г.

