

80
18.06.06

ИНФОРМАЦИОННА ЛИСТОВКА
ЗА ПАЦИЕНТИ

CYCLO 3 FORT

Твърди капсули



ИАЛ
ОДОБРЕНСИ
ДАТА № б. 128-06-2004

ИНФОРМАЦИОННА ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТИ

Преди да използвате лекарството, прочетете информацията по-долу.

Cyclo 3 Fort
Цикло 3 Форт

СЪСТАВ

Ruscus aculeatus dry extract..... 150,00 mg
Hesperidine methyl chalcone..... 150,00 mg
Ascorbic acid..... 100,00 mg
Помощни вещества: талк; магнезиев стеарат; силициев диоксид, колониден;
полиоксиетилен гликол 6.000.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Твърди капсули

ОПАКОВКА

Кутия от 30 жълто-оранжеви капсули в блистери (ПВХ/Алуминий)

ИМЕ И АДРЕС НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Производител: PIERRE FABRE PRODUCTION / SIMAPHAC
Zone Industrielle de Chateaurenard
45220 Chateaurenard
France

Притежател: PIERRE FABRE MEDICAMENT
45, Place Abel Gance
92654 BOULOGNE

ФАРМАКОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ

Този лекарствен продукт е венотоник (повишава тонуса на вените) и вазопротектор (увеличава резистентността на капиллярните кръвоносни съдове).

ПОКАЗАНИЯ

Лечение на:

- Симптоми свързани с венозна и лимфна недостатъчност (тежест в



- Симптоми свързани с венозна и лимфна недостатъчност (тежест в краката, болка, оток, постфлебитен синдром)
- Маточни кръвотечения, предизвикани от противозачатъчни, съдържащи малки дози прогестерон или от вътрешноточни средства против забременяване (след провеждане на клинични и параклинични изследвания).
- Функционални симптоми на хемороидни кризи.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Продуктът е противопоказан при данни за свръхчувствителност към някоя от съставките.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В случай на диария, прекъснете лечението и се обърнете към лекуващия ви лекар.

Лекарственият продукт съдържа макрогол и оцветител Е110. Оцветителят може да причини алергична реакция, включително астматичен пристъп. Рискът от алергии е по-голям при пациенти, алергични към аспирин.

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Cyclo3 fort приложен по време на бременност се понася добре както от майката, така и от плода.

Предупредете вашия лекар в случай на бременност или кърмене.

ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Няма.

ВЗАЙМОДЕЙСТВИЯ

Уведомете лекуващия ви лекар, ако приемате и други лекарства включително и такива, които се отпускат без рецепт.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА УПОТРЕБА

Дозировката и продължителността на лечение се определят от лекуващия лекар.

Препоръчваната доза на Cyclo 3 fort твърди капсули е от 2 до 3 твърди капсули дневно при лечението на:

- Симптоми свързани с венозна и лимфна недостатъчност (тежест в краката, болка, оток, постфлебитен синдром)
- Маточни кръвотечения, предизвикани от противозачатъчни или



вътрематочни средства против забременяване (след провеждане на клинични и параклинични изследвания).

Cyclo 3 fort се използва в доза 4 до 5 капсули дневно за лечение на функционални симптоми на хемороидни кризи.

ПРЕДОЗИРАНЕ

Не са известни случаи на предозиране.

При приемане на по-голяма от препоръчваната доза се обърнете към лекар.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Някои незначителни стомашно-чревни смущения (гадене, болки, киселини, парене и диария). Възможни са и редки случаи на кожни реакции.

Уведомете лекуващия ви лекар при поява на нежелани реакции, дори и такива, които не са описани в листовката.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

По лекарско предписание.

СРОК НА ГОДНОСТ

2 години

Да не се използва след посочения върху опаковката срок на годност.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо място, недостъпно за деца, при температура под 25 °C.

ДАТА НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕКСТА

Август 1999

Преди използване, проверете срока на годност изписан върху опаковката

