

LINDRON®
ЛИНДРОН
Таблетки 10 mg
 Алендронат натрий

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
 ДАТА 13.03.07

Това е Вашата листовка за Линдрон, запазете я за справка, дакато приемате Линдрон. Ако не разбирате нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Какво съдържа Линдрон?

1 таблетка Линдрон съдържа 10 mg алендронат натрий.

Помощи вещества: прешелатиново нишесте, царевично нишесте, микрокристална целулоза, колоиден безводен силиций, магнезиев стеарат.

Какво е Линдрон и как действа?

Линдрон спада към групата лекарствени средства, наречени бифосфонати. Бифосфонатите спират загубата на костна тъкан по време на менопауза, когато обикновено се наблюдава изтиняване и отслабване на костите. Линдрон действа като избирателно подтиска разграждането на костта и увеличава костната маса.

Кога се приема Линдрон?

Линдрон се прилага за лечение на остеопороза при жени след менопауза. Остеопороза е намаляване на плътността на костната тъкан, което прави костите крехки и податливи на счупване.

Кога не бива да се приема Линдрон?

- свръхчувствителност към някоя от съставките на лекарственото средство;
- намалено съдържание на калций в кръвта (хипокалцемия);
- увреждане в хранопровода и други фактори, които забавят изпразването на хранопровода (например стесняване на хранопровода и перфорация);
- при пациенти, които не са в състояние да стоят изправени или седнали поне за 30 минути.
- ако сте имали или имате болка, подуване или въкочаняване на челюстта, «чувство на тежест на челюстта» или разклапане на зъбите.


Кога е противопоказан Линдрон? Какви предупреждения при употреба на Линдрон трябва да спазвате?

Преди да започнете лечение с Линдрон трябва да сте сигурни, че не страдате от ниски нива на калций в кръвта. Моля направете това изследване. Ако страдате от бъбречна недостатъчност информирайте лекаря за да прецените степента на заболяването и дали е подходящо лечение с Линдрон.

Информирайте лекаря за лечение с други медикаменти, преди да започнете лечение с Линдрон.

Линдрон, подобно на други бифосфонати, може да предизвика дразнене на лигавицата на горната част на стомашно-чревния тракт. Ако имате проблеми със стомашно-чревния тракт като гастрит, язва на стомаха и/или дванадесетопръстника, колит, проблеми с хранопровода или друго заболяване, информирайте лекаря преди да започнете с употребата на това и всяко друго лекарство.

При лечение с Линдрон е възможно да получите признания на дразнене и дори на възпаление на хранопровода: като връщане на храна, придружено с горчив вкус в устата, затруднено прогълтане, болезнено гълтане; усещане, че храната стои в хранопровода, усещане за парене и горене в стомаха с уризване и киселини. При такива реакции от



страница на хранопровода, моля спрете незабавно взимането на лекарството и се обърнете веднага към лекаря, който е предписал медикамента.

За да се ускори преминаването на лекарственото средство към стомаха и да се намали опасността от дразнене на хранопровода и/или от нежелани странични явления, е важно да се спазват точно следните инструкции:

- Линдрон трябва да се приема след ставане сутрин най-малко с 200 ml чешмяна вода (не с минерална вода),
- поне 30 минути, след като сте приели Линдрон не трябва да лягате,
- поне 30 минути, след като сте приели Линдрон не трябва да вземате друго лекарство или да се храните,
- таблетките Линдрон не трябва да се дъвчат или разтварят в устата поради опасността от разраняване на устата или на гълтката,
- специално се забранява таблетките Линдрон да се вземат преди лягане вечер или преди ставане сутрин.

Приема ли се Линдрон при бременност и кърмене?

Линдрон не се прилага при бременност и кърмене.

Как влияе Линдрон върху способността за шофиране и работа с машини?

Линдрон не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Как да приемаме Линдрон, ако приемаме и други медикаменти?

Едновременната употреба на Линдрон с минерали (калций, желязо), с лекарства за лечение на киселини в стомаха или с други лекарства през устата може да повлияят приема на Линдрон. Затова трябва да се спазва разлика от поне 30 минути между дозата Линдрон и друго лекарствено средство, приемано през устата.

Как да дозираме и да прилагаме Линдрон?

Ако лекарят не е предискал друго, препоръчваната доза за лечение на остеопороза е 1 таблетка (10 mg) дневно. Не дъвчете и не смучете таблетката Линдрон, погълнете я цяла. За постигане на максимален ефект е много важно таблетката да се приема след ставане сутрин и поне 30 минути преди първото поемане на храна, напитки или приемане на други лекарства за деня. Запомнете, трябва да приемате таблетката най-малко с 200 ml чешмяна вода (но не минерална, нито с кафе, чай или сок) и не трябва да лягате поне 30 мин., след като сте взели Линдрон. От правилният прием на Линдрон зависи правилното Ви лечение.

Важно е да се приема допълнително калций и витамин D, ако количеството им в храната е недостатъчно. Приема на тези или други допълнителни медикаменти трябва да е с повече от 30 минути разлика след приема на Линдрон.

Какво да правим, ако приемем повече таблетки Линдрон?

Незабавно потърсете лекарска помощ. При случайно приемане на повече таблетки Линдрон може да се очакват реакции от страна на стомашно-чревния тракт. Затова се препоръчва прием на медицински выглен, мляко или лекарства приемани против киселини в стомаха. Тези медикаменти се свързват с Линдрона. Не трябва да се предизвика повръщане и трябва да останете в напълно изправено положение, за да не се дразни хранопровода.

Какви нежелани реакции можем да очакваме при прием на Линдрон?



Както при всяко друго лекарство и при Линдрон освен полезно има и нежелано действие на медикамента. Макар и рядко при приемане на Линдрон се наблюдават нежелани реакции. Основно те са от страна на храносмилателния тракт. При наблюдаване на следните и други нежелани реакции потърсете лекарска консултация: коремна болка, гадене, повръщане, болки и тежест в долната част на стомаха и болка в гърдите.

Други нежелани странични явления са: главоболие и болки в мускулите и костите.

Много рядко са наблюдавани реакции на свръхчувствителност, които може да включват оток на кръвоносните съдове, обрив (рядко съчетан с фоточувствителност) и сърбеж.

В редки случаи се съобщава за възпаление на очите (двойно виждане, болка в очите, подуване на клепачите). При всички такива случаи, както и случаи на съмнение за нежелана реакция свързана с приема на медикамента обърнете се незабавно към лекуващия Ви лекар. Само лекарят може да прецени дали да се спре или продължи лечението с Линдрон.

Рядко са наблюдавани случаи на остеонекроза на челюстта, свързана най-вече със забавено лечение и инфекции, получавани след вадене на зъб.

Как и докога да съхраняваме Линдрон?

Лекарството не трябва да се употребява след изтичане на срока на годност, отбелзан на опаковката. Да се съхранява под 30°C. Да се пази от влага.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Запомнете:

Лекарят е предписал този медикамент само за Вас, не го препоръчвайте на други лица, дори да имат същите като Вашите оплаквания. Само лекар може да предпише Линдрон.

Опаковка

14 таблетки

28 таблетки

Произведено от

Krka, d.d., Novo-mesto, Slovenia

Редактирано

4 октомври 2000

