



ZANTAC™
ЗАНТАК™
филмирани таблетки 150 mg

ranitidine hydrochloride

Тази листовка се отнася само за ZANTAC. Тя ви информира за най-важното относно лекарството. Моля, прочетете я внимателно, преди да започнете приема.

Наименование на лекарството
Името на лекарството е ZANTAC (ЗАНТАК).

Какво представлява и какво съдържа ZANTAC

Лекарствената форма на продукта е филмирани таблетки, съдържащи лекарственото вещество ranitidine (ранитидин) под формата на ranitidine hydrochloride (ранитидин хидрохлорид). Всяка бяла кръгла таблетка съдържа 150 милиграма ranitidine (под формата на ranitidine hydrochloride).

Лекарството съдържа и следните помощни вещества: микрокристална целулоза (E460), магнезиев стеарат, метилхидроксипропил целулоза (E464), триацетин и титанов диоксид (E171).

Количество в опаковката: 20 таблетки.

Как действат таблетките

Лекарственото вещество в ZANTAC, ranitidine, е от групата на т. нар. H₂-антагонисти. То намалява количеството киселина в стомаха, затова се използва за:

- Лечение и предотвратяване на язва на стомаха и на дванадесетопръстника;
- Отстраняване на инфекцията, причинена от бактерията *Helicobacter pylori*, винаги заедно с антибиотик;
- Предотвратяване на кръвоизлив от язви;
- Лечение и предотвратяване на проблеми, причинени от наличие на киселина в хранопровода или излишък на киселина в стомаха, което понякога може да предизвика болка или дискомфорт, познато като лошо храносмилане, диспепсия или киселини в стомаха;
- Предотвратяване на язви които могат да са нежелан ефект от приложение на лекарства за лечение на артрит;
- За предотвратяване на връщането на киселина от стомаха по време на анестезия, преди хирургични операции.

Ако не сте сигурни за нещо, попитайте вашия лекар.

Преди да започнете приема на таблетките

Преди да започнете приема на ZANTAC, трябва да си зададете следните въпроси:

- Известно ли ви е да сте алергични към ZANTAC, ranitidine или друга съставка на продукта?
- Бременна ли сте, опитвате ли се да забременеете?
- Кърмите ли?
- Казвал ли ви е лекарят, че бъбреците ви не функционират добре или че трябва да спазвате безсолна диета?
- Известно ли ви е, че страдате от рядкото заболяване порфирия?

Ако отговорът на някой от гореизброените въпроси е ДА, консултирайте се с лекар преди да започнете приема.

Дори и при тези обстоятелства вашият лекар може да прецени, че е необходимо приложение на ZANTAC.



Листовка за пациента

Как да приемате таблетките

Приемайте таблетките така, както ви е предписал лекуващият лекар. Лекарят определя дозировката и продължителността на лечението. Важно е лекарството да бъде приемано точно в определеното време. Обичайната дозировка е една таблетка от 150 mg сутрин и една таблетка от 150 mg вечер. Поглъщайте таблетката цяла с вода.

След като започнете приема на таблетките

След няколко дни трябва да се почувствате по-добре, но не спирайте да приемате таблетките, защото болката или дискомфортът могат да се появят отново. При повечето хора, които приемат това лекарство, то не създава проблеми. Както при всички лекарства, при някои пациенти могат да се появят нежелани лекарствени реакции.

Какво да направите, ако пропуснете една доза

Ако сте забравили да приемете някоя доза, не се безпокойте. Приемете дозата веднага след като си спомните и продължете приемането на следващите дози точно според определеното време. Ако обаче е наближило времето за следващия прием, изчакайте до неговото настъпване и приемете направо следващата доза. Не приемайте двойна доза.

Какво да направите, ако сте приели твърде много таблетки

Придържайте се към препоръчаната ви дозировка. Малко вероятно е приемането на повече таблетки да създаде опасност за вас, освен ако не сте приели твърде много таблетки наведнъж, или ако сте на безсолна диета (с малко натрий). В такъв случай незабавно потърсете лекар или повикайте Бърза помощ!

Нежелани лекарствени реакции

Наред с полезния си ефект лекарството може да причини и нежелани реакции. Безопасността на ranitidine е установена от широката му употреба по света повече от десет години и според повечето хора, които го приемат, то не им създава проблеми. Въпреки това, подобно на всяко друго лекарство, то може да доведе до нежелани реакции.

Някои хора са алергични към определени лекарства. Ако скоро след като сте започнали да приемате таблетките се появят някои от следните ефекти, СПРЕТЕ лекарството и незабавно уведомете лекаря:

- Внезапно хриптене или стягане в гръдния кош;
- Подуване на клепачите, лицето или устните с или без неравномерен обрив където и да е по кожата на тялото;
- Необяснима треска;
- Чувство на прималяване, особено когато ставате.

Консултирайте се с лекар, колкото е възможно по-скоро, ако забележите някои от следните нежелани реакции:

Редки:

Възпаление на черния дроб, което може да причини едно или повече от следните състояния:

- Гадене;
- Повръщане;
- Загуба на апетит;
- Общо неразположение;
- Повишена температура;
- Сърбеж;
- Пожълтяване на кожата и очите;
- Потъмняване на урината;
- Обърканост;
- Бавен или неритмичен пулс;
- Необичайна умора, недостиг на въздух или склонност към инфекции или нараняване което може да е предизвикано от промени в кръвната картина;



Листовка за пациента

- Силна стомашна болка, в редки случаи предизвикана от възпаление на панкреаса;
- Замъглено зрение.

Консултирайте се с лекар **още при следващото си посещение**, ако забележите някои от следните нежелани реакции:

Редки:

- Болки в мускулите или ставите;
- Потиснатост;
- Халюцинации;
- Неконтролирани движения (това състояние обикновено е временно и се подобрява при спиране на лечението);
- Възпаление на кръвоносните съдове (васкулит);
- Косопад (алопеция);
- Повишена чувствителност на гърдите и/или уголемяването им при мъжете. Обратимо смущение в сексуалната функция (импотентност). Смущението във сексуалната функция е обикновено обратимо и състоянието се подобрява при спиране на приложението на лекарството.

Нечести:

- Главоболие;
- Световъртеж.

Понякога лекарят може да ви предпише антибиотици, които причиняват диария. Ако се чувствате некомфортно или имате необичайно и необяснимо неразположение, уведомете лекаря.

Ако не почувствате облекчение след проведеното лечение или почувствате влошаване въпреки лечението, уведомете вашия лекуващ лекар незабавно.

Съхранение на ZANTAC

Съхранявайте таблетките на сухо място, при температура под 30°C и далече от източници на топлина.

Съхранявайте лекарството на място, недостъпно за деца.

Не употребявайте таблетките след датата на изтичане на срока на годност, посочена върху опаковката.

Кой произвежда лекарството и притежава разрешение за употребата му в България
ZANTAC филмирани таблетки се произвежда от GlaxoWellcome S.A., Aranda de Duero, Burgos, Испания или от GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. 189 Grunwaldzka Street, Poznan, Полша. Притежател на разрешението за употреба е ГлаксоСмитКлайн ЕООД, ул. Димитър Манов, бл.10, 1408 София, България.

Запомнете

Това лекарство е предписано лично на вас. Никога не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, дори ако техните симптоми са подобни на вашите.

Тази листовка не ви дава пълна информация за лекарството.

Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни в нещо, обърнете се към вашия лекуващ лекар.

Може да ви се наложи да прочетете тази листовка отново, затова не я изхвърляйте докато не употребите лекарството в опаковката.

ZANTAC (ЗАНТАК) е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies

Дата на последна редакция: септември 2006 г.

