


ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

DIPROSONE[®] ointment
ДИПРОЗОН[®] маз
Betamethasone dipropionate



Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите, както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Дипрозон и за какво се използва
2. Преди да използвате Дипрозон
3. Как да използвате Дипрозон
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Дипрозон
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИПРОЗОН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Маз, за приложение върху кожата.

Активно вещество: *Betamethasone dipropionate* 0,64 mg/g (еквивалентен на 0,5 mg *betamethasone*).
Помощни вещества: Течен парафин, бял мек парафин.

Дипрозон маз притежава противовъзпалителни, противосърбежни и противоалергични свойства. Отнася се към група вещества, наречени кортикостероиди и се използва за лечение на кожни заболявания, като: дерматит (токсичен дерматит), атопичен и алергичен дерматит, невродермит (хроничен лихен симплекс), лихен планус, екземи (включително нумуларна екзема и екзематозен дерматит), дисхидроза, себореен дерматит, екسفолитивни дерматити, застоен дерматит.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДИПРОЗОН

Не използвайте Дипрозон

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към *betamethasone*, някоя от останалите съставки на Дипрозон или към друг кортикостероиден лекарствен продукт;
- върху наранена кожна повърхност;
- в случаи на бактериална, вирусна или гъбична кожна инфекция или върху кожа с прояви на акне.

Обърнете специално внимание при лечението с Дипрозон

- Този лекарствен продукт е предназначен за приложение върху кожата. Може да се нанася и върху лигавиците. Попадането му в очите или в непосредствена близост до тях трябва да се избягва.
- Дипрозон не трябва да се използва за продължителни периоди от време, върху големи участъци от кожата или върху наранена кожна повърхност, поради риск от нарастване на



резорбираното количество и проява на нежелани реакции от общ характер. Това в особено голяма степен се отнася за употребата при деца.

- Кортикостероидите могат да маскират симптомите на инфекция, да причинят изостряне на инфекция и забавено зарастване на рани.
- В случай на силно дразнене или на тежка алергична реакция, лечението трябва да се прекрати.

Употреба на други лекарства

Не са известни взаимодействия с други лекарствени продукти. Независимо от това, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарствени продукти, включително и такива, отпускани без рецепта, информирайте Вашия лекар.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, употребата на Дипрозон трябва да се избягва, особено за продължителни периоди от време или върху големи участъци от кожата.

При бременност и кърмене, Дипрозон може да се прилага само по изрично лекарско предписание.

Шофиране и работа с машини

Не е приложимо.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДИПРОЗОН

Дипрозон маз се нанася на тънък слой с леко втриване върху засегнатото място, обикновено веднъж или два пъти дневно (сутрин и вечер). Върху третираната кожа не трябва да се поставят превръзки, освен по препоръка на Вашия лекар.

Дипрозон маз не трябва да се прилага върху дълбоки кожни рани, отворени рани, изгаряния или наранена кожа.

Употребата на Дипрозон маз се препоръчва в случай на сухи и напукани лезии.

Продължителността на лечението зависи от повлияването на симптомите; при постигане на желания резултат, приложението трябва да се прекрати. Не се препоръчва употреба, по-продължителна от две седмици, без изрично лекарско указание.

Препоръчва се измиване на ръцете след приложението на Дипрозон.

Ако сте приложили повече от необходимата доза Дипрозон

Не употребявайте лекарствения продукт по-често или за по-продължително време от предписаното. При предозиране или в случай на случайно поглъщане през устата (особена предпазливост да се проявява при употреба при деца), незабавно потърсете лекарска помощ.

Симптомите на предозиране са сходни с тези, които се наблюдават при твърде честа или продължителна употреба (вижте точка 4 **Възможни нежелани реакции**).

Острите симптоми на предозиране са обратими.

Лечението е симптоматично. При необходимост, да се поддържа електролитният баланс.

Ако сте пропуснали да приложите Дипрозон



Ако забравите да приложите Дипрозон маз, направете го колкото е възможно по-скоро, след което се върнете към нормалната схема на приложение.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Дипрозон маз може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Като цяло лечението с Дипрозон се понася добре. Понякога могат да се наблюдават: парене, сърбеж, дразнене, суха кожа, зачервяване на кожата, възпаление на космените фоликули, увеличено окосмяване, акне, обезцветяване или изтъняване на кожата, стрии, вторични инфекции, възпаление на кожата около устата, контактни алергии.

Както при всички кортикостероиди, употребата на Дипрозон маз върху обширни участъци от кожата, в по-голямо количество и за продължителни периоди от време, особено при приложение под стегната превръзка, може да доведе до повишена резорбция през кожата, в количества причиняващи общи (системни) нежелани реакции. Те могат да включват отичане на лицето, шията и торса, увеличение на теллото. В такива случаи е необходимо да се консултирате с Вашия лекар.

Деца и юношите, при които се налага лечение с този лекарствен продукт, трябва да бъдат наблюдавани от лекар. При тях опасността от общи ефекти, например изоставане в растежа, е по-голяма, дори при употреба на по-малки количества.

Деца, пациентите с тънка или увредена кожа, или страдащи от тежки чернодробни заболявания, са по-чувствителни по отношение на нежеланите лекарствени реакции.

След спиране на лечението са възможни рецидиви.

Както при всички продукти за приложение върху кожата, не може да се изключи появата на алергични реакции. В тези случаи се препоръчва незабавно прекратяване на лечението и консултация с лекар.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ДИПРОЗОН

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Срок на годност 5 години.

Срок на годност след отваряне: 3 месеца.

Не използвайте след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да не се замразява.

Пазете от слънчева светлина.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Номер на разрешението за употреба

20020271/21.03.2002

Притежател на разрешението за употреба

Schering-Plough Europe

73, rue de Stalle 73

B-1180 Brussels



Belgium

Производител

Schering-Plough N.V.
Industriepark 30
B-2220, Heist-op-den-Berg
Belgium

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Шеринг-Плау Централ Ийст
Клон България
ул. „Проф. Милко Бичев“ №7
1504 София
Тел. 02/ 944 10 73

Дата на последно одобрение на листовката

