

ИАЛ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 26.06.07

ANTISTENOCARDIN 25 mg обвити таблетки
АНТИСТЕНОКАРДИН 25 mg обвити таблетки
(dipyridamole)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- *Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.*
- *Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекуващ лекар или фармацевт.*
- *Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.*
- *Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.*

В тази листовка

1. Какво представлява ANTISTENOCARDIN и за какво се използва
2. Преди да приемете ANTISTENOCARDIN
3. Как да приемате ANTISTENOCARDIN
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на ANTISTENOCARDIN
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ANTISTENOCARDIN И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

• ANTISTENOCARDIN съдържа активно вещество дипиридамола, принадлежащо към група лекарства, наричани антитромбоцитни агенти. Той променя свойствата на тромбоцитите (кръвни плочици), които нормално са отговорни за съсирването на кръвта. Дипиридамола се използва за предпазване от образуване на кръвни съсиреци самостоятелно или в комбинация с аспирин при: пациенти на антикоагулантна (противосъсирваща) терапия след клапно протезиране, коронарна болест на сърцето (нарушено оросяване на сърдечния мускул), мозъчно-съдова болест, след сърдечни операции – аорто-коронарен байпас.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ ANTISTENOCARDIN

Не приемайте ANTISTENOCARDIN ако имате:

- Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества;
- Ако имате доказана тежка генерализирана коронаросклероза (склероза на съдовете на сърцето), инфаркт на миокарда в остър стадий.



Обърнете специално внимание при лечението с ANTISTENOCARDIN

- Ако имате установено заболяване на сърцето – стенокардия;
- Ако скоро сте прекарвали инфаркт на миокарда;
- Ако имате нарушения на кръвообращението на сърцето, ниско кръвно налягане или други сърдечни проблеми;
- Ако имате установена myasthenia gravis (парализа на скелетната мускулатура);
- Ако имате сериозно заболяване, свързано с кървене или повишена склонност към кървене;
- Ако планирате манипулация, която може да се отрази върху склонността Ви към кървене.

Употреба на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Лечението може да се повлияе, ако приемате едновременно: лекарства за понижаване на кръвното налягане, противосъсирващи лекарства (аценокумарол, аспирин, хепарин) противовъзпалителни (ибупрофен, индометацин, пироксикам), лекарства за лечение на мускулна слабост (холинестеразни инхибитори), флударабин (противотуморни лекарства), лекарства, намаляващи стомашната киселинност (антиацидни), теофилин, аминофилин, кофеин. Ако приемате аденозин, уведомете лекаря си, че ще приемате дипиридамол.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Не се препоръчва приложението на продукта по време на бременност и в периода на кърмене, с изключение на случаите, когато очаквания терапевтичен ефект надвишава потенциалния риск.

Шофиране и работа с машини

ANTISTENOCARDIN не повлиява активното внимание и може да се прилага при шофьори и оператори на машини.

Важна информация относно някои от съставките на ANTISTENOCARDIN

Лекарственият продукт съдържа захароза. Неподходящ е при пациенти с вродена непоносимост към фруктозата, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захарозно/изомалтозен дефицит.

Този продукт съдържа лактоза и пшенично нишесте. Неподходящ е при пациенти с лактазна недостатъчност, галактоземия или глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция. Може да представлява опасност за пациенти с цьолиакия (глутенова ентеропатия). В състава на дражираното покритие се съдържа глицерол (във високи дози може да причини главоболие, стомашно дразнене, диария), макрогол – може да причини диария във високи дози.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ANTISTENOCARDIN

Дозата и продължителността на лечение се определят от лекуващия Ви лекар. Важно е да вземате лекарството така, както лекарят Ви го е предписал. Не трябва да променяте дозите или да преустановявате лечението, без да се



консултирайте преди това с лекаря, дори ако се чувствате добре. Опитайте да вземате лекарството по едно и също време всеки ден.

Таблетките се приемат преди хранене.

Дозировката и продължителността на лечението с дипиридамола се определят в зависимост от това какви симптоми лекувате.

Препоръчаната доза за възрастни като профилактично антиагрегантно средство е 2-3 таблетки 3-4 пъти дневно.

При комбинирано лечение с аспирин дозата е по 2 таблетки 3 пъти дневно.

Antistenocardin не се препоръчва при деца.

Ако сте приели повече от необходимата доза ANTISTENOCARDIN

Симптомите на предозиране са в резултат на изразената хипотония (спадане на кръвното налягане). Може да се появят някои от следните симптоми: топли вълни, зачервяване, изпотяване, безпокойство, чувство на слабост, стенокардна болка.

Незабавно се консултирайте с лекар!

Ако сте пропуснали да приемете ANTISTENOCARDIN

Ако пропуснете една доза, вземете я колкото е възможно по-скоро. Ако почти е станало време за следващата доза, вземете я както обикновено. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Продължете да вземате лекарството, както Ви е предписано.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, ANTISTENOCARDIN може да има нежелани реакции. Те обаче не се наблюдават при всички пациенти, така че Вие можете да не получите никаква реакция.

Често в началото на лечението може да се наблюдават: гадене, повръщане, замаяност, световъртеж, главоболие, болки в мускулите. В повечето случаи тези нежелани реакции са леки и изчезват постепенно, тъй като Вашият организъм свиква с приема на лекарството. Други по-редки нежелани реакции са: топли вълни, понижаване на кръвното налягане, обрив, затруднено дишане, оток на устните, езика или лицето, в някои случаи гръдна болка или влошаване симптомите на стенокардия, сърдечни аритмии. При някои пациенти се повишава склонността към образуване на жлъчни камъни. Много рядко е възможно намаляване броя на тромбоцитите (вид кръвни клетки).

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ANTISTENOCARDIN®

На защитено от светлина място, при температура под 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте ANTISTENOCARDIN след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ



Какво съдържа ANTISTENOCARDIN

Всяка обвита таблетка ANTISTENOCARDIN съдържа активна съставка дипиридамола (*dipyridamole*) 25 мг.

Другите съставки са: лактоза монохидрат, пшенично нишесте, колоиден силициев диоксид безводен, микрокристална целулоза, желатин, магнезиев стеарат, талк.

Състав на обвивното покритие: талк, титанов диоксид, захароза, желатин, арабска гума, оцветител опалукс червен, макрогол, глицерол.

Как изглежда ANTISTENOCARDIN и какво съдържа опаковката

Обвити таблетки кръгли, двойно изпъкнали с червен цвят.

30 таблетки в блистер от PVC/алуминиево фолио; по 2 или 40 блистера в картонена кутия, заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

СОФАРМА АД

София 1220, ул. "Илиенско шосе" 16, България

Дата на последно одобрение на листовката
май 2006

