

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CARDURA® (КАРДУРА) 1 mg; 2 mg и 4 mg таблетки
доксазозин (*doxazosin*) като доксазозин мезилат (*doxazosin mesylate*)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Cardura и за какво се използва
2. Преди да приемете използвате Cardura
3. Как да приемате използвате Cardura
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Cardura
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение 2
Към РУ №: 11-0824-11-0826/11.10.07
Одобрено: 5/25.09.07

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CARDURA И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

CARDURA (КАРДУРА) принадлежи към група лекарства, наречени алфа-блокери. Използва се за лечение на високо кръвно налягане, смущения в отделянето на урина и симптоми, дължащи се на увеличение на простатата при мъжете.

При пациентите, приемащи CARDURA за високо кръвно налягане (хипертония), лекарството упражнява своя ефект като разширява кръвоносните съдове и така кръвта преминава по-лесно през тях. Това води до намаляване на кръвното налягане.

При пациенти с увеличение на простатата, CARDURA се приема за лечение на симптомите на трудното или често уриниране. Тези симптоми са често срещани при пациенти с увеличение на простатата. CARDURA оказва своя ефект, като отпуска мускулатурата около изхода на пикочния мехур и мускулатурата на простатата и така урината преминава по-лесно.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕТЕ CARDURA

Не приемайте Cardura

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към група лекарства, наречени квиназолини (напр. доксазозин) или към някоя от останалите съставки на Cardura;
- ако кърмите;
- ако сте на възраст под 16 години;
- ако имате редки наследствени проблеми като галактозна непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция.

Обърнете специално внимание при употребата на Cardura

- ако Вие сте бременна или се опитвате да забременеете, информирайте Вашия лекар за това преди да започнете да употребявате таблетките;
- ако имате заболявания на черния дроб, информирайте Вашия лекар за това преди да започнете да употребявате таблетките



- ако приемате лекарства от групата на инхибиторите на фосфо-диестераза-5, информирайте Вашия лекар за това преди да започнете да употребявате таблетките.

В много нисък процент от пациентите, CARDURA, както и всички други лекарства от тази група, може да причини така наречения “ортостатизъм” и/или “синкоп”. Това са състояния, дължащи се на внезапно спадане на кръвното налягане при рязко изправяне или промяна в положението на тялото. Само в редки случаи CARDURA причинява внезапна краткотрайна загуба на съзнание – “синкоп”. За да избегнете възникването на тези състояния, приемайте CARDURA с чаша вода в седнало положение и изчакайте известно време преди да се изправите. Ако почувствате замайване, виене на свят или причерняване пред очите, легнете като поставите главата си на ниско. След преминаване на симптомите информирайте Вашия лекар за това.

Прием употреба на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Прием на Cardura с храни и напитки

Може да вземате Вашите таблетки преди или след хранене.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Способността Ви за шофиране и работа с машини може да бъде намалена, особено в началото на лечението.

Важна информация относно някои от съставките на Cardura

Това лекарство съдържа лактоза. Ако имате редки наследствени проблеми като галактозна непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция, не приемайте Cardura.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ CARDURA

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Винаги приемайте Cardura точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза е една таблетка дневно.

Ако приемате CARDURA за първи път, обичайната доза е 1 mg дневно. Началната доза е ниска, за да се намали до минимум рискът от рязко спадане на кръвното налягане и причинените от това замайване, виене на свят или краткотрайна загуба на съзнание. След това обичайната доза е 2 до 4 mg дневно. При определени условия тя може да бъде увеличена до максимална доза от 8 mg дневно при лечение на увеличение на простатата или до максимална доза от 16 mg дневно при лечение на високо кръвно налягане.

Най-добре е да приемате таблетките си с чаша вода по едно и също време всеки ден. Може да вземете Вашите таблетки преди или след хранене.

Продължавайте да вземате таблетките си всеки ден.

Важно е да продължавате да приемате Вашите таблетки. Те ще Ви помогнат да продължите да се чувствате добре. Не променяйте сами дозата и не спирайте приема на таблетките без първо да се консултирате с Вашия лекар. Не чакайте да свършите таблетките, за да посетите Вашия лекар.



Ако сте приели повече от необходимата доза Cardura

Приемът на твърде много таблетки наведнъж може да Ви накара да се чувствате зле. Ако изпиете няколко таблетки наведнъж, това може да е опасно за здравето Ви. Обадете се веднага на Вашия лекар или отидете в най-близкото болнично заведение.

Ако сте пропуснали да приемете Cardura

Ако пропуснете прием на таблетка, не приемайте въобще дозата. След това продължете по предишната схема.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Cardura може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Наблюдавани са следните нежелани лекарствени реакции при приложение на CARDURA: намален брой бели кръвни клетки, намален брой тромбоцити; световъртеж, шум в ушите; замъглено виждане; коремна болка, запек, диария, парене, събиране на газове, сухота в устата, повръщане, гадене; болка, слабост, оток, умора, неразположение; холестаза, хепатит, жълтеница; алергична реакция; абнормни функционални чернодробни показатели, увеличаване на теглото; безапетитие; ставни и мускулни болки, болки в гърба, мускулни крампи, мускулна слабост; намалена чувствителност, мравучкане, треперене на ръцете, замаяност, главоболие, ортостатична замаяност (при рязко изправяне от седнало или легнало положение), сънливост, синкоп; възбуда, тревожност, депресия, безсъние, нервност; болезнено уриниране, кръв в урината, нарушено уриниране, често уриниране, нощно уриниране, отделяне на голямо количество урина, незадържане на урината; увеличаване на млечните жлези при мъжете, импотентност, болезнена и продължителна ерекция; ринит (хрема), утежнен бронхоспазъм, кашлица, задух, кръвотечение от носа; опадване на косата, сърбеж, зачервяване, кожен обрив, уртикария; горещи вълни, ниско кръвно налягане, ортостатизъм (прилошаване, особено при рязко изправяне от седнало или легнало положение).

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА CARDURA

Да не се съхранява при температура под 30°C.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Cardura след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.



6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Cardura

- Активната съставка е доксазозин (като доксазозин мезилат). Всяка таблетка съдържа 1 mg, 2 mg или 4 mg доксазозин.
- Другите съставки са лактоза, магнезиев стеарат, микрокристална целулоза, натриев лаурил сулфат и натриев нишестен гликолат.

Как изглежда Cardura и какво съдържа опаковката

Таблетките от 1 mg са бели, кръгли, двойно изпъкнали, маркирани с CN1 на едната страна и PFIZER на другата.

Таблетките от 2 mg са бели, продълговати, двойно изпъкнали, маркирани с CN2 на едната страна и PFIZER на другата.

Таблетките от 4 mg са бели, ромбоидни, двойно изпъкнали, маркирани с CN4 на едната страна и PFIZER на другата.

Таблетките се предлагат в опаковки, съдържащи 30 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

PFIZER EUROPE MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich
Kent, England CT13 9NJ

Производител

Heinrich Mack Nachf, Heinrich Mack Strasse 35, 89257 Illertissen, Germany

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България
Тел.: +359 2 970 4333

Дата на последно одобрение на листовката: октомври 2007 г.

