

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИНДИПАМ SR 1,5 mg

INDIPAM SR 1,5 mg

Indapamide

филмирани таблетки с удължено освобождаване

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или към фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от неожеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка неожелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Индипам SR и за какво се използва.
2. Преди да приемете Индипам SR.
3. Как да приемате Индипам SR.
4. Възможни нежелани реакции.
5. Съхранение на Индипам SR.
6. Допълнителна информация.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №: 11-1345, 07.02.2008	
Одобreno: 8/20.11.07r	

1. Какво представлява Индипам SR и за какво се използва

Индипам SR е сулфонамиден диуретичен лекарствен продукт (повишаващ отделянето на урина), който е фармакологично близък до групата на така наречените тиазидни диуретици. Лечебното му действие се изразява в намаляване на повишеното кръвно налягане.

Индипам SR е лекарствен продукт, който се използва за лечение на високоатенциално кръвно налягане (хипертония).



2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИНДИПАМ SR

Не използвайте Индипам SR:

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към индапамид или към други сулфонамиди;
- Ако имате тежка бъбречна недостатъчност;
- При спиране отделянето на урина (анурия);
- При тежка чернодробна недостатъчност или чернодробна енцефалопатия;
- При абнормно понижено съдържание на калий в кръвта (хипокалиемия);
- По време на бременност и кърмене.

Обърнете специално внимание при употребата на Индипам SR

Приемането на този лекарствен продукт трябва да бъде прекратено в случай на чернодробно увреждане.

Използвайте внимателно този лекарствен продукт в следните случаи: нарушен водно-електролитно равновесие; подагра; диабет или увредена бъбречна функция.

Индипам SR съдържа активно вещество, което може да даде положителна реакция при допинг тестове.

Вашият лекар може да назначи лабораторни изследвания, за да наблюдава Вашето лечение.

Прием на други лекарства

*Моля, информирайте своя лекуваш лекар или фармацевт, ако приемате или
наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускані без
рецепта.*

Индипам SR не е желателно да се предписва при съпътстваща терапия с литиеви препарати или с някои лекарствени продукти, използвани за лечение на нарушения на сърдечния ритъм.

Прием на Индипам SR с хrани и напитки

Няма данни за необходимост от специален хранителен режим или ограничения на определени видове хrани и напитки по време на лечението с този продукт.



Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Диуретиците, в това число и индапамид, могат да предизвикат увреждане на плода при бременни жени. Поради това този продукт не се прилага по време на бременност.

Шофиране и работа с машини

Индипам SR не влияе върху бдителността, но понякога могат да настъпят различни реакции във връзка с понижаване на кръвното налягане, особено в началото на лечението или при включване на друг понижаващ кръвното налягане продукт. В резултат на това може временно да се наруши способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Индипам SR

Индипам SR съдържа лактоза (млечна захар) и е неподходящ за хора с лактозна непоносимост.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ИНДИПАМ SR

Винаги приемайте Индипам SR точно както е посочено в тази листовка. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт!

Препоръчителна дневна доза:

Една таблетка (1,5 mg) дневно, препоръчително сутрин.

Приема се през устата, като таблетките се приемат цели, без да се дъвчат, с достатъчно вода след хранене.

Ако сте приели повече от необходимата доза Индипам SR

При прием на по-висока доза от предписаната, веднага се обърнете за помощ към лекар!

Симптомите на предозиране включват гадене, повръщане, слабост, стомашно-чревни оплаквания, нарушения на водно-електролитното равновесие. Мерки за ускорено извеждане на продукта от организма - предизвикване на повръщане



стомашна промивка, очистителни, поддържане на дихателната и сърдечно-съдовата функция. При нужда приложение на симптоматични средства.

Ако сте пропуснали да приемете Индипам SR

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Направете това във времето на следващия регулярен прием.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Индипам SR може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Могат да бъдат наблюдавани следните нежеланите лекарствени реакции:

- Нарушения на нервната система: главоболие, беспокойство, отпадналост, слабост, умора, депресия, световъртеж, двойно виждане, безсъние, раздразнителност, напрегнатост, мускулни спазми и крампи.
- Стомашно-чревни нарушения: сухота в устата, гадене, повръщане, запек или разстройство, стомашно неразположение и болка, стомашни колики, жълтеница, в много редки случаи панкреатит.
- Сърдечни нарушения: ортостатична хипотония (понижаване на артериалното налягане при изправяне), сърцебиене, нарушения на сърденния ритъм.
- Нарушения на имунната система: обриви, уртикария, сърбеж и други по-тежки алергични реакции (васкулит, еритема мултиформе, синдром на Стивънс Джонсън, пурпура, фоточувствителност, алергичен пневмонит, анафилактични реакции).
- Нарушения на бъбреците и пикочните пътища: често уриниране, повищено отделяне на урина, нощно уриниране, намалено сексуално желание.
- Респираторни, гръден и медиастинални нарушения: ринит, фарингит, синуит, кашлица.
- Нарушения на кръвта и лимфната система: промени в клетъчния състав на кръвта (агранулоцитоза, левкопения, тромбоцитопения, хемолитична анемия, апластична анемия).



- Изследвания: ниско съдържание в кръвта на калий, натрий, хлор, повищено ниво на пикочната киселина и кръвната захар, повишаване на серумните урея и креатинин.

Ако някоя от неожеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка неожелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ

Съхранява се на място недостъпно за деца.

Без специални условия на съхранение

Не използвайте Индипам SR след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Индипам SR

- Активната съставка в една таблетка е индапамид (Indapamide) 1,5 mg .
- Другите съставки са: лактозаmonoхидрат; нишесте,прежелатинизирано; хипромелоза; колоидален силициев диоксид; магнезиев стеарат; макрогол 6000; титанов диоксид.

Как изглежда Индипам SR и какво съдържа опаковката

Бели до почти бели, кръгли двойно изпъкнали филмирани таблетки.

По 10 таблетки в блистери от PVC/AL фолио.

По 3 блистера в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

„Актавис“ ЕАД

ул. „Атанас Дуков“ № 29

1407, София, България

Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771



Производител
"Балканфарма Дупница" АД,
България, гр. Дупница, ул. "Самоковско шосе" 3
Тел. (0701) 58 196; Факс. (0701) 58 555

За всяка допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.

„Актавис“ ЕАД
ул. „Атанас Дуков“ № 29
1407, София, България
Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Дата на последно одобрение на листовката – Ноември 2007

