



**ИАЛ**  
**ОДОБРЕНО!**  
 ДАТА ...27.04.04г.

Информация за пациента

25.2.2003

*Прочетете тази листовка внимателно, преди да започнете да вземате това лекарство.  
 Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.  
 Ако имате още въпроси, моля попитайте лекуващия си лекар или фармацевт.  
 Това лекарство е предписано лично на Вас и не трябва да го давате на други. То може да им навреди, дори и ако техните симптоми са същите като Вашите.*

**FROMILID® uno / ФРОМИЛИД уно**  
**таблетки с изменено освобождаване 500 mg**  
*Clarithromycin / кларитромицин*

#### Състав

1 таблетка с изменено освобождаване съдържа 500 mg clarithromycin.

*Помощни вещества:* натриев алгинат, натриев калциев алгинат, лактозаmonoхидратна, повидон, полисорбат 80, колоидален безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат, талк, хидроксипропил метилцелулоза, хинолиново жълто оцветител (Е104), титаниев диоксид (Е171), пропиленгликол.

#### Какво представлява Fromilid uno?

Fromilid uno е антибиотик от групата на макролидите. Той действа предимно чрез спиране растежа на бактериите, които причиняват инфекции в човешкия организъм.

#### За какво се използва Fromilid uno?

Fromilid uno е предназначен за лечение на инфекции, причинени от чувствителни към кларитромицин микроорганизми: инфекции на дихателните пътища (напр. инфекции на синусите, гърлото, сливиците, бронхите и белите дробове), инфекции на кожата и подкожните тъкани.

#### Кой не трябва да взема Fromilid uno

*Уведомете лекуващия си лекар, ако имате някакво хронично заболяване, обменно нарушение, ако сте свръхчувствителни или ако вземате други лекарства.*

Не трябва да вземате Fromilid uno, ако сте свръхчувствителни към clarithromycin, към някое от помощните вещества на лекарството или към други макролидни антибиотици. Не трябва да вземате това лекарство и ако имате много тежко увреждане на черния дроб и бъбреците или ако вземате terfenadine, cisapride, pimozide или astemizole. Едновременната употреба на тези лекарства с clarithromycin може да доведе до опасно нарушение на сърдечния ритъм (аритмия).

Не трябва да вземате Fromilid uno таблетки едновременно с лекарства, които съдържат ерго алкалоиди.

#### Предпазни мерки и предупреждения

Кажете на лекуващия си лекар ако имате увредена чернодробна или бъбречна функция.

Употребата на лекарството не се препоръчва, ако имате порфирия.

Антибиотиците могат да променят нормалната чревна флора, така че броят на бактериите, които предизвикват диария, се увеличава в червата. В отделни случаи диарията е тежка и продължителна. Посъветвайте се с лекуващия си лекар, поради диарията може да е необходимо да спрете лечението с Fromilid uno.

Fromilid uno таблетки не се дават на деца под 12-годишна възраст, защото за тях съподходяща суспенсията.

#### Специални предупреждения помошните вещества

Fromilid uno съдържа натрий. Трябва да имате това предвид, ако ограничавате употребата на сол.



## Употреба на Fromilid uno с храна и напитки

Вземайте Fromilid uno по време на хранене. Прегълъщайте всяка таблетка цяла с най-малко половин чаша течност.

## Бременност и кърмене

*Посъветвайте се с лекуващия си лекар или фармацевт, преди да вземете никакво лекарство.*

Не са провеждани проучвания за вредните ефекти на Fromilid uno по време на бременността при човека. Тъй като безопасността по време на бременност не е установена, вашият лекар ще ви предпише това лекарство само въз основа на преценката си, че ползата от лечението надхвърля потенциалния рисков.

Clarithromycin се отделя в кърмата, така че се препоръчва да не кърмите по време на лечението.

## Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма съобщения, че лекарството повлиява способността за шофиране и работа с машини.

## Какви други лекарства може да взаимодействват с Fromilid uno?

*Кажете на лекуващия си лекар или фармацевта, ако вземате или насърко сте вземали никакви други лекарства, дори такива, които не са Ви предписани от лекар.*

Clarithromycin се преработва в черния дроб, където той може да подтисне действието на някои ензими (P<sub>450</sub>), които са необходими за метаболизма на редица други лекарства. Намаленият метаболизъм води до повишаване на серумните им концентрации, което може да предизвика сериозни нежелани реакции. Поради това не трябва да вземате clarithromycin заедно с terfenadine, cisapride, pimozide, astemizole и ерго алкалойди. При някои лекарства, които трябва да се вземат продължително време, лекарят ще реши да се измерват серумните им концентрации и, ако е необходимо, ще коригира дозите им. Тези лекарства включват: theophylline, лекарства за сърцето (напр. digoxin, disopyramide), седативни средства (напр. triazolam, midazolam), лекарства за лечение на епилепсия (напр. carbamazepine, phenytoin), лекарства, които се прилагат при трансплантиране на органи (cyclosporin и tacrolimus) и лекарства за лечение на някои инфекции (напр. rifabutin и itraconazole).

Едновременната употреба на clarithromycin и лекарства, за намаляване на количеството на холестерола и другите липиди в кръвта (lovastatin и simvastatin) не се препоръчва, защото може да предизвика болки в мускулите, а в редки случаи и разрушаване на мускулите (рабдомиолиза).

Ако вземате clarithromycin едновременно с лекарства, предотвратяващи съсирането на кръвта (напр. warfarin), действието на тези лекарства може да се засили и да се появят кървени. Лекарят допълнително ще проверява времето на кръвосъсиране.

Ако clarithromycin се прилага заедно с ritonavir (също лекарство за лечение на HIV инфекции), концентрациите на clarithromycin в серума се увеличават. Поради това на пациентите с бъбречна недостатъчност трябва да се дават таблетки clarithromycin с незабавно освобождаване.

Тъй като не са провеждани изследвания на взаимодействията между clarithromycin с удължено освобождаване и zidovudine, препоръчва се пациентите, които се нуждаят от двете лекарства, да вземат clarithromycin с незабавно освобождаване.

Едновременното приложение на clarithromycin, таблетки с незабавно освобождаване и zidovudine, за лечение на пациенти със СПИН, понижава концентрацията на zidovudine. Взаимодействието е малко вероятно да бъде от значение при поддържането от





пациентите, но все пак при някои от тях може да се наблюдава по-голямо понижение на концентрацията на zidovudine.

Clarithromycin не повлиява действието на противозачатъчните таблетки.

#### **Дозировка и начин на приложение**

*Стриктно спазвайте указанията на лекаря. Не трябва да променяте дозите или да прекъсвате лечението, без преди това да се консултирате с лекуващия си лекар.*

Не трябва да чупите таблетките. Прегълтнете всяка таблетка с най-малко половина чаша течност по време на хранене.

Дозировката и продължителността на лечение зависят от вида на инфекцията, мястото на инфекцията, възрастта на пациента и отговора на лечението. Вземайте лекарството както е предписано от лекуващия ви лекар.

Възрастни и деца над 12-годишна възраст обикновено вземат 1 таблетка от 500 mg на 24 часа. При по-тежки инфекции дневната доза е 2 таблетки от 500 mg на 24 часа.

Лечението обикновено продължава 7 до 14 дни.

*Ако имате чувството, че ефектът на лекарството е твърде слаб, консултирайте се с лекуващия си лекар или фармацевт.*

#### **Ако сте взели повече Fromilid упо от колкото трябва**

*Ако сте взели свръхдоза, консултирайте се незабавно с лекуващия си лекар или фармацевт.*

Предозирането обикновено предизвиква стомашно-чревни нарушения (гадене, повръщане, коремна болка), главоболие и объркане.

#### **Ако забравите да вземете Fromilid упо**

*Не вземайте двойна доза, за да компенсирате забравената.*

Ако сте забравили да вземете дозата в определеното време, вземете я веднага след като се сетите. Вземете следващата доза в обичайното време.

#### **Рискове при спиране на лечението с Fromilid упо**

Вземайте лекарството толкова продължително, колкото е предписан лекаря. Ако прекъснете лечението твърде рано, болестта може да рецидивира.

#### **Нежелани реакции**

*Както всички лекарства, Fromilid упо може също да има нежелани реакции.*

Нежеланите реакции включват гадене, намален апетит, повръщане, диария и коремна болка. Когато диарията е тежка и продължителна, това може да бъде признак на особена форма на възпаление на дебелото черво ( псевдомемброзен колит), което може да бъде свързано с употребата на антибиотици. Може да се появят също и възпаление на устата (стоматит, глосит), преходно оцветяване на зъбите и езика, главоболие, реакции на свръхчувствителност (уртикария, анафилаксия, много рядко синдром на Stevens-Johnson, токсична епидермална некролиза), преходна промяна на мириса и вкуса, преходно увреждане на слуха, изтръгване на крайниците, шум в ушите и нарушения на централната нервна система при отделни пациенти (световъртеж, замайване, объркане, чувство на страх, безсъние, кошмар, виддане ичуване на въображаеми неща, психически нарушения, гърчове). Нежеланите реакции са предимно слабо изразени и преходни.

Изключително рядко се появява повишена активност на чернодробните ензими и пожълтяване на кожата (холестатична жълтеница). Тези ефекти може да са съществени, но те най-често са преходни. При малко пациенти с тежко основно заболяване, вземащи лекарства, обаче се съобщава за чернодробна недостатъчност със смъртен изход.





се чувствате добре и забележите пожълтяване на кожата, незабавно се консултирайте с лекуващия си лекар.

Рядко се наблюдава значително понижение на нивото на кръвната захар (хипогликемия), предимно при пациенти, които вземат едновременно лекарства за намаляване на нивото на кръвната захар.

При отделни пациенти са наблюдавани болки в ставите и мускулите, бъбречна недостатъчност, възпаление на панкреаса и намаляване на броя на тромбоцитите (тромбоцитопения).

По време на лечение с clarithromycin при отделни пациенти може да възникнат особени нарушения на сърденчния ритъм (камерна тахикардия и "torsades de pointes").

*Ако забележите някои нежелани реакции, дори и ако те не са споменати в тази листовка, моля информирайте лекуващия си лекар или фармацевта.*

#### **Съхранение и срок на годност**

*Не използвайте след датата на изтичане на срока на годност, отбелязана върху опаковката.*

Да се пази от влага. Да се съхранява при температури до 25°C.

*Да се съхранява на места, недостъпни за деца.*

#### **Опаковка**

5 таблетки с изменено освобождаване

7 таблетки с изменено освобождаване

14 таблетки с изменено освобождаване

#### **Информация за предписване**

Само по лекарско предписание.

#### **Производител**

Krka, d.d., Novo mesto, Slovenia

#### **Редактирана на**

25 ноември, 2002 г.

