

ЛИСТОВКА

И А Л
ОДОБРЕНО!
ДАТА 13.07.04

1. **НАИМЕНОВАНИЕ**

HUMEXDRY Adults, syrup
ХЮМЕКСДРАЙ за възрастни, сироп

2. **СЪСТАВ****Лекарствено вещество:**

Dextromethorphan hydrobromide.....0.133 g
За 100 ml

Помощни вещества: натриев бензоат (0.2 g), кайсиева есенция, лимонена киселина, разтвор на захароза, пречистена вода.

Една супена лъжица от 15 ml (една доза) съдържа 20 mg dextromethorphan hydrobromide и 11.5 g захароза.

3. **ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА**

Сироп, бутилка от 200 ml

4. **ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА:**

Laboratoires URGO, 42, rue de Longvic, 21300 CHENOVE, FRANCE

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Laboratoires URGO, 9 rue Petitot – 21000 DIJON, FRANCE

5. **ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА**

Противокашлично лекарство средство.

6. **ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА HUMEXDRY сироп?****Показания:**

Краткотрайно лечение на суха и дразнеща кашлица при възрастни (над 15 години).

7. **ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ УПОТРЕБА**• **Противопоказания**

НЕ ТРЯБВА ДА УПОТРЕБЯВАТЕ това лекарство, ако:

- сте алергични към една от неговите съставки,
- имате астма,
- страдате от дихателни заболявания,
- лекувате се с MAO инхибитор (лекарство, предписвано в някои случаи на депресия),
- кърмите.

Ако имате някакви съмнения, обърнете се за съвет към лекар или фармацевт.

• **Обърнете специално внимание преди употреба****Предупреждения**

- Пациенти с хронично (продължително) бронхиално или белодробно заболяване, придружено с кашлица с отделяне на храчки, трябва да се консултират с лекар.
- Не използвайте това лекарство за лечение на влажна кашлица. В такива случаи кашлицата е естествен защитен механизъм, необходим за отделяне на бронхиалната секреция.
- Ако кашлицата стане влажна и се придружава от застой, храчки и висока температура, консултирайте се с лекуващия си лекар.



- Тъй като съдържа захароза, това лекарство не трябва да се прилага при пациенти с непоносимост към фруктоза, влошено усвояване (малабсорбция) на глюкоза-галактоза или дефицит на захараза-изомалтоза (редки обменни заболявания).

Предпазни мерки при употреба

- Ако забележите, че температурата Ви се повишава, или че симптомите продължават, или се влошават след 5 дни, не увеличавайте дозата над препоръчаната и не вземайте едновременно друго лекарство против кашлица, а **СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР**.
- Не вземайте едновременно с това лекарство против кашлица друго лекарство, което облекчава бронхиалната секреция (експекторант, муколитик).
- Това лекарство съдържа 11.5 g захароза във всяка супена лъжица от 15 ml и това трябва да се вземе предвид при определяне дневното количество при диета с ниско съдържание на захар или при диабет.
- **Лекарствени взаимодействия** *Моля, уведомете лекуващия си лекар или фармацевт, ако вземате или наскоро сте вземали други лекарства, дори такива, които не са Ви предписани от лекар, и особено ако се отнася за MAO инхибитор (лекарство, предписвано при някои случаи на депресия).*

Това лекарство съдържа противокашлично средство **dextromethorphan**. Други лекарства съдържат същото или друго противокашлично средство. Не комбинирайте тези лекарства, защото може да превишите най-високата препоръчвана доза.
(виж раздел "Как да се прилага това лекарство").

Други взаимодействия. Избягвайте консумирането на алкохолните напитки по време на лечението

• **Бременност / Кърмене**

Консултирайте се с лекуващия лекар или фармацевт преди да вземате това лекарство.

Бременност

Това лекарство съдържа dextromethorphan. Може да се употребява по време на бременност само при условие, че се взема за кратко време (няколко дена) и в препоръчаните дози.

В края на бременността обаче, приемът на прекомерни количества dextromethorphan може да има отрицателен ефект върху новороденото.

Винаги се консултирайте с Вашия лекар преди да вземате лекарство, съдържащо dextromethorphan.

Кърмене

Това лекарство се отделя в майчиното мляко.

Прекомерно високи дози dextromethorphan, приложени при кърмачки, може да предизвикат паузи в дишането и да намалят телесния тонус на новороденото кърмаче. Поради това лекарството е противопоказано за употреба по време на кърмене.

- **Шофиране и работа с машини:** Това лекарство може да предизвика летаргия и преходна сънливост, замайване и намаляване на бдителността, които може да бъдат опасни за шофьорите на МПС и за тези, които работят с някои машини. Дози от 15 ml намалява след първите няколко дози. Може да е полезно да се започне лечението вечер.



Същият ефект се засилва от алкохолни напитки.

- **Помощни вещества с доказано действие**

Този лекарствен продукт съдържа захароза. Когато се приема, съгласно препоръките за дозиране, всяка доза (1 супена лъжица от 15 ml) набавя до 11.5 g захароза. Неподходящ при хора с вродена непоносимост към фруктозата, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбация или захарозно/изомалтазен дефицит.

- **Информация за спортисти** . Няма данни за влияние.

8. КАК ДА СЕ ПРИЛАГА HUMEXDRY, сироп. ТОВА ЛЕКАРСТВО Е САМО ЗА ВЪЗРАСТНИ (над 15 години).

- **Дозировка и честота на приложение**

- На един прием : 1 супена лъжица от 15 ml
- При необходимост дозата се повтаря след 4 часа.
- В никакъв случай не трябва да се надхвърля доза от 6 супени лъжици дневно.

Това лекарство трябва да се взема, само когато се появи кашлица. Например, ако кашлицата се появява само вечер, еднократна доза от това лекарство вечер може да бъде достатъчна.

Пациенти в напреднала възраст или болни с чернодробни заболявания - консултирайте се с лекуващия лекар, тъй като е необходимо коригиране на дозата.

- **Продължителност на лечението**

Това лекарство не трябва да се употребява повече от 5 дни.

Ако имате впечатление, че ефектът на това лекарство е много силен или много слаб, консултирайте се с лекуващия лекар или с фармацевт.

- **Предозиране.** Ако сте приели повече, отколкото трябва от това лекарство- СПРЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО И НЕЗАБАВНО СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ЛЕКАР.
- **Ако сте пропуснали да вземете лекарството.** *Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата единична доза.*

9. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, и този лекарствен продукт може да има нежелани реакции :

- замаяване, сънливост,
- гадене, повръщане, запек,
- възможни алергични реакции (кожен обрив, зачервяване или подуване на лицето, езика и гърлото, редки случаи на дихателен дискомфорт с внезапно начало).

В такива случаи спрете лечението и се консултирайте с лекуващия лекар.

Ако забележите нежелани реакции, които не са споменати в тази листовка, уведомете лекуващия лекар.

10. СЪХРАНЕНИЕ

Лекарството да се съхранява на място – недостъпно за деца

11. СРОК НА ГОДНОСТ

Да не се употребява след изтичане срока на годност, отбелязан в опаковката

12. Последна редакция на листовката: 21.01.2003

