


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА



Gluctam®
Глюктам®

Gliclazide 80 mg

Таблетки

СЪСТАВ

Всяка таблетка съдържа:

Gliclazide (INN)..... 80 mg

Помощни вещества: глицеролов бехенат, лактоза, повидон, анхидриден колоиден силикат, магнезиев стеарат.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ

Таблетки.

Кутия от 60 таблетки.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА

Това лекарство е ХИПОГЛИКЕМИЗИРАЩ СУЛФАНИЛУРЕЕН ПРЕПАРАТ – ПЕРОРАЛЕН ПРЕПАРАТ ЗА ПОНИЖАВАНЕ НА КРЪВНАТА ЗАХАР.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Това лекарство се използва при възрастни за лечение на неинсулинозависим диабет (тип 2) в комбинация с диетични мерки и физическо натоварване при положение, че само тези мерки не са достатъчни за постигане на нормални стойности на кръвната захар.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Това лекарство НЕ ТРЯБВА да се използва в следните случаи:

- ако сте алергичен към гликлазид или към някои от неговите компоненти, към някое друго лекарство от същата група (сулфанилурейни препарати), към сулфонамиди;
- ако страдате от инсулино-зависим (тип I) диабет, особено ювенилен диабет, диабет, усложнен от кетоза и ацидоза, или диабетна прекома;
- ако страдате от тежки чернодробни и бъбречни увреждания;
- ако в момента се лекувате с миконазол;
- ако кърмите.

Не се препоръчва комбинирането на това лекарство с фенилбутазон, даназол или алкохол, освен ако нямате други указания от Вашия лекар.

АКО ИМАТЕ НИКАКВИ СЪМНЕНИЯ, ПОСЪВЕТВАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР.



СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Хипогликемия

Това лекарство може да предизвика хипогликемия (понижаване на стойностите на кръвната захар): ако почувствате изпотяване, силен глад, треперене, преbledняване, зрителни нарушения, или ако се почувствате зле или проявите необичайно поведение, хапнете незабавно малко захар или нещо сладко и се консултирайте с Вашия лекар.

Хипогликемията се появява по-често, ако Вашата диета е твърде стриктна или небалансирана, след продължително или силно физическо натоварване, след консумация на алкохол или след приемане на друго хипогликемизиращо средство.

Затова, ако приемате хипогликемизиращ сулфанилуреен препарат, Вие трябва да сте сигурен:

- че се храните редовно: важно е да имате редовни основни хранения, включително закуска. Никога не трябва да пропускате някое от основните хранения поради повишаване на риска от хипогликемия, при положение, че Вашата диета включва недостатъчно захар или е небалансирана по отношение на захарта;
- че приемате редовно лекарството.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

- спазвайте колкото може повече диетата, предписана от Вашия лекар;
- редовно проверявайте стойностите на кръвната си захар, както е предписано от Вашия лекар;
- информирайте Вашия лекар:
 - o ако Ви предстои хирургична намеса, ако имате травма, температура или инфекция, или ако не се храните добре;
 - o ако се опитвате да забременеете или мислите, че сте бременна;
 - o ако вземате някакви други лекарства, особено *противовъзпалителни средства, бета-блокери, кортикостероиди*;
- информирайте Вашия зъболекар, че се лекувате от диабет.

АКО ИМАТЕ НЯКАКВИ СЪМНЕНИЯ, ПОСЪВЕТВАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.

ЕФЕКТ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Пациентите трябва да бъдат предупредени за симптомите на хипогликемия и да бъдат внимателни когато шофират или работят с машини.



ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ТРЯБВА ДА ИНФОРМИРАТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ, АКО ПРИЕМАТЕ НЯКАКВО ДРУГО ЛЕКАРСТВО, ОСОБЕНО:

Даназол (хормонално лечение), кортикостероиди, диуретици, миконазол (лекарство за лечение на инфекции, предизвикани от микроскопични гъбички), или алкохол;

Определени лекаствени комбинации трябва да се избягват, тъй като могат да окажат важно влияние върху стойностите на Вашата кръвна захар. Не трябва да разчитате на Вашата собствена преценка, когато прилагате лекарства.

БРЕМЕННОСТ - КЪРМЕНЕ

- Бременност

Ако сте бременна, Вашият диабет трябва да се лекува с инсулин.

Информирайте Вашия лекар, ако се опитвате да забременеете. Ако сте бременна, информирайте вашия лекар, за да може да Ви назначи по-подходяща терапия.

Ако по време на лечението установите че сте бременна, незабавно уведомете Вашия лекар.

Преди да вземете някакво лекарство се посъветвайте с Вашия лекар или фармацевт.

- Кърмене

По време на терапията с това лекарство кърменето е противопоказано.

Преди да вземете някакво лекарство се посъветвайте с Вашия лекар или фармацевт.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ИЗИСКВАЩИ БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА ПРИ НЯКОИ ПАЦИЕНТИ

Лактоза: този лекарствен продукт съдържа лактоза. Не се препоръчва за пациенти с лактазен дефицит, галактоземия или синдром на нарушено усвояване на глюкоза/галактоза

ДОЗИРОВКА

ВИНАГИ СТРИКТНО СПАЗВАЙТЕ ЛЕКАРСКОТО ПРЕДПИСАНИЕ.

Вашият лекар е избрал подходящата за Вас доза Glucam. Трябва стриктно да я спазвате. Не трябва да я променяте без да получите неговото съгласие.

НАЧИН НА ПРИЕМАНЕ

Прилага се перорално.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО

Спазвайте лекарското предписание.



ПРЕДОЗИРАНЕ

В случай на предозирание незабавно потърсете Вашия лекар.

Хипогликемия (изпотяване, пребледняване, силен глад, неразположение) се появява, ако приемете свръхголяма доза, което незабавно трябва да се третира с вземане на захар (4 до 6 бучки). Ако пациентът е в безсъзнание, потърсете веднага лекуващия лекар и Бърза медицинска помощ.

КАКВО ДА СЕ НАПРАВИ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЕДНА ИЛИ НЯКОЛКО ДОЗИ СА БИЛИ ПРОПУСНАТИ

Да не се взема двойна доза, за да се компенсира единичната доза, която е била забравена.

- Ако предписаната доза е 1 таблетка на ден:
Вземете една таблетка със следващото хранене.
- Ако предписаната доза е 2 таблетки на ден и ако сте забравили сутришната си таблетка:
Вземете една таблетка по обяд.
- Ако предписаната доза е 3 таблетки на ден:
Вземете само предвидената таблетка (= една таблетка) със следващото хранене.
- Ако предписаната доза е 4 таблетки на ден два пъти дневно (сутрин и вечер) и сте забравили сутришните си таблетки:
Вземете две таблетки по обяд.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Glucam може да предизвика нежелани реакции.

- Симптоми на хипогликемия (изпотяване, пребледняване, силен глад, прилошаване);
- Кожни реакции: уртикария, сърбеж, кожен обрив;
- Гастроинтестинални смущения: гадене, диария, чувство на тежест в стомаха, запек, хепатит;
- Отклонения от нормата на кръвните и чернодробни лабораторни показатели.

ИНФОРМИРАЙТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР ЗА ВСЕКИ НЕЖЕЛАН ИЛИ ТРЕВОЖЕЩ ВИ ЕФЕКТ, КОЙТО НЕ Е ОПИСАН В НАСТОЯЩАТА ЛИСТОВКА.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

Да се съхранява при стайна температура.

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА.

ДА НЕ СЕ ПРИЕМА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ, ПОСОЧЕН ВЪРХУ ОПАКОВКАТА.



**ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА ЗА
ПАЦИЕНТА**
Юни 2004

**ПРОИЗВОДИТЕЛ И ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА
УПОТРЕБА:**

EGIS PHARMACEUTICALS LTD.

Kereszturi ut 30-38.

1106 Budapest, HUNGARY

Тел.: (0036 1) 265 5555

Факс: (0036 1) 265 5529

По лиценз на:

Les Laboratoires Servier Industrie

905 route de Saran

45520 Gidy - FRANCE

