

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

IMODIUM *lingual*

ИМОДИУМ лингвал

Таблетки

ЗА КАКВО СЕ УПОТРЕБЯВА ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ?

При диария ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ втвърдява изпражненията и намалява диаричните дефекации.

Вие бихте могли да приемате ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ при внезапно настъпила (остра) диария или при продължаваща дълго време (хронична) диария.

Също така, бихте могли да използвате ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ в случай, че сте с диария след оперативно отстраняване на част от червата.

КОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ УПОТРЕБЯВА ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ?

Не давайте ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ на деца под 5-годишна възраст*.

Не използвайте ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ:

- ♦ ако имате кръв в изпражненията или висока температура;
- ♦ ако имате възпаление на дебелото черво (като например, улцерозен колит или псевдомембранозен колит, възникнал в резултат на употреба на антибиотици);
- ♦ ако Вашият лекар Ви е казал, че имате състояние, наречено забавено преминаване през червата. Примери за такова състояние са запек или подуване на корема;
- ♦ ако Ви е известно, че сте свръхчувствителен към медикамента.

Ако се съмнявате, помолете Вашия фармацевт или лекар за съвет.

КАКВИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕТЕ?

Въпреки че ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ преустановява диарията, препаратът не отстранява причините за нейната поява. Когато това е възможно, необходимо е също да се проведе лечение и на причините за възникване на диарията.

- ♦ В случай, че имате диария трябва да знаете, че губите значително количество течности. Ето защо Вие трябва да компенсирате загубата посредством повишен прием на течности. Това важи в особена степен за деца. Вашият фармацевт би могъл да Ви предпише специален прах, съдържащ захар и соли. След добавянето му към вода той ще замести също и солевите загуби, възникнали вследствие на диарията. Разтворът е особено подходящ за деца.
- ♦ При внезапен (остър) пристъп на диария ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ обикновено преустановява симптомите за 48 часа. В противен случай, спрете да приемате медикамента и посетете Вашия лекар.

*Ако ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ се използва без лекарско предписание, възрастово ограничение за деца не моля, вземайте под внимание това ограничение във възрастта съобразно конкретната ситуация.



- ◆ Ако Вие сте болен от СПИН и сте лекуван от диария с ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ, при поява на каквито и да е признаци на подуване на корема, незабавно прекратете приема на ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ и кажете на Вашия лекар.

Бременност

Ако сте бременна или считате, че може да сте бременна, трябва да уведомите Вашия лекар, който ще реши дали бихте могла да приемате ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ.

Кърмене

Съветваме Ви да не приемате ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ по време на кърмене, тъй като малки количества от него попадат във Вашата кърма.

Способност за шофиране или работа с машини

Заедно с диарията може да се наблюдават умора, виене на свят или сънливост. Поради това е препоръчително да внимавате при шофиране или работа с машини.

Взаимодействия с други лекарства

Уведомете Вашия лекар в случай, че приемате лекарства, които забавят перисталтиката на стомаха и червата (например антихолинергични продукти), тъй като тези средства биха могли да засилят прекомерно ефекта на ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ.

Намалена чернодробна функция

Уведомете Вашия лекар в случай, че имате проблеми с черния дроб; Вие може да се нуждаете от стриктно лекарско наблюдение по време на лечението с ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ.

КАК ТРЯБВА ДА СЕ УПОТРЕБЯВА ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ И В КАКВА ДОЗИРОВКА?

Дозата ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ, която трябва да вземате, зависи от Вашата възраст и от типа на диарията.

ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ се предлага под форма на бързо разтварящи се таблетки, които се слагат върху езика: те лесно се стопяват. Поради това не е необходимо да ги приемате с течност.

Вие може да употребявате ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ по всяко време на деня.

За да отворите пликчето, откъснете края, на указаното място и извадете блистера. За да извадите таблетките от блистера:



- издърпайте нагоре края на фолиото;
- откъснете натълно фолиото;
- натиснете навън таблетката;
- извадете таблетката.



Не избутвайте таблетките през фолиото, понеже това ще ги повреди.

Възрастни (включително хора в напреднала възраст):

- при внезапно появила се (остра) диария вземете едновременно две таблетки, след което приемайте по една таблетка след всяка диарична дефекация. При отделяне на изпражнения с плътна или твърда консистенция или при отсъствие на чревна активност в продължение на 24 часа, не приемайте повече таблетки!
- при продължителна (хронична и водниста) диария, правилната доза трябва да се определи след консултация с Вашия лекар.

Но: Не приемайте повече от 8 таблетки за период от 24 часа!

 Деца над петгодишна възраст

- при внезапно появила се (остра) диария да се започне с една таблетка, след което да се приема по една таблетка след всяко рядко изхождане. Ако детето изхожда изпражнения с плътна или твърда консистенция или при отсъствие на чревна активност в продължение на 24 часа, не давайте повече таблетки.
- при продължителна (хронична) диария правилната доза трябва да се определи след консултация с Вашия лекар.

Но: Никога не давайте повече от максималната препоръчвана доза на ден и на килограм тегло на Вашето дете!

Тегло на детето в килограми (кг)	Максимален брой таблетки ИМОДИУМ лингвал за денонощие
до 14 кг	никога повече от 2 таблетки
до 20 кг	никога повече от 3 таблетки
до 27 кг	никога повече от 4 таблетки
до 34 кг	никога повече от 5 таблетки
до 40 кг	никога повече от 6 таблетки
до 47 кг	никога повече от 7 таблетки
до 54 кг	никога повече от 8 таблетки

Ако се съмнявате, помолете Вашия лекар или фармацевт за обяснение.

 **НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ**

Обикновено ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ се понася добре и появата на нежелани ефекти е малко вероятна, ако се взема според указанията.

Както всички лекарства, ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ също може да има някои нежелани ефекти.

Може да имате чувство за парене или щипане на езика, непосредствено след като сте взели таблетката. Това преминава бързо.

Възможна е поява на запек и подуване на корема, както и затруднено уриниране. В такъв случай преустановете приема на ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ и ако тези ефекти са тежки, се консултирайте с Вашия лекар.



Рядко се наблюдава свръхчувствителност към ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ. Тя би могла да се разпознае, например, по появата на зачервяване на кожата, сърбеж, недостиг на въздух или по подуването на лицето. При възникване на някой от тези признаци посетете Вашия лекар.

Възможна е поява на някои от следните оплаквания, но те биха могли да се дължат и на самата диария: коремни болки или неразположение, гадене и повръщане, умора, замаяност и сънливост, сухота в устата и събиране на газове.

Ако забележите каквито и да е странични ефекти, неотбелязани в тази листовка, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

ПРЕДОЗИРАНЕ

В случай, че сте приели твърде голямо количество ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ повикайте лекар, особено, ако имате някой от следните симптоми: скованост на мускулите, некоординирани движения, сънливост, затруднено уриниране или отслабено дишане.

Реакцията на децата към високи дози ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ е изразена в по-силна степен в сравнение с тази на възрастните. В случай, че детето е приело твърде голямо количество от медикамента или проявява някой от посочените по-горе симптоми, незабавно извикайте лекар.

Информация за лекаря в случай на предозирание:

- Инжектирайте налоксон.
- При нужда инжектирайте повторно налоксон след 1-3 часа.
- Ако се налага следете състоянието на пациента поне през следващите 48 часа.

КАК ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ?

Съхранявайте ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ при температура между 15° и 30° С (това е нормалната стайна температура).

След отваряне на пликчето: съхранявайте на сухо място, защото таблетките са чувствителни към влага. Поради това таблетките, останали в отвореното пликче вече не трябва да се използват след 6 седмици (при горещ и влажен климат) или 6 месеца (при сух и умерен климат).

Не трябва да използвате това лекарство, ако таблетките са се смалили. Това лекарство може да се съхранява само за ограничен период от време. Не използвайте ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ след датата (месец и година), посочена след "EXP", даже и ако той е бил съхраняван правилно. Препоръчва се да върнете старото лекарство на Вашия фармацевт.

КАКВО СЪДЪРЖА ИМОДИУМ?

На Вас Ви е предписан ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ за лечение на Вашата диария.

Лекарственото вещество на ИМОДИУМ ЛИНГВАЛ е лоперамид (loperamide).

Таблетките са бели, кръгли и всяка от тях съдържа 2 милиграма лоперамид хидрохлорид (loperamide hydrochloride).

Таблетката съдържа също желатин, манитол, аспартам, ментов есенциален натриев хидрогенкарбонат.



ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА:

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30,
Beerse 2340, Belgium

ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

Janssen Pharmaceutica N.V.,

Turnhoutseweg 30, B-2340

Beerse – Belgium

Janssen-Cilag S.P.A.,

Via C. Janssen, 04010 Borgo San Michel,

I-04010 Latina, Italy

Cardinal Health,

Blagrove Swindon,

Wiltshire SN5 8YS

ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА:

м. март 2003 год.



Какво трябва да знаете за лекарствата...

Винаги информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако употребявате други лекарства, тъй като някои медикаменти не трябва да се вземат едновременно.

Лекарствата са много добре изпитани преди да се дадат на пациентите. Поради това е малко вероятно да възникне нещо нередно, ако те се използват правилно, т.е. ако ги прилагате както следва:

- единствено за целта, за която лекарството Ви е дадено;
- само в предписаното количество;
- само за предписания период от време.

Съхранявайте всички лекарства на недостъпно за деца място.

- Никога не позволявайте на други да използват предписаното на Вас лекарство и никога не употребявайте лекарства, предписани на други пациенти.
- Съхранявайте всички лекарства в оригиналната им опаковка и на сухо място (никога в банята например).
- Ако някой е приел свръхдоза от някое лекарство, обадете се на лекар или на Центъра за Бърза медицинска помощ тел.: 150.

