

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Korincare tablets prolong. 20 mg

Коринкер таблетки с удължено освобождаване 20 мг

Качествен и количествен състав

Лекарствено вещество:

Всяка таблетка с удължено освобождаване съдържа 20 mg nifedipine.

Помощни вещества:

Във вътрешността: микрокристална целулоза, натрий нишесте глюконат, манитол, колоиден анхидрид силикон, провидон, магнезиев стеарат, натриев лаурил сулфат.

В покритието на таблетката: метилхидроксипропилцелулоза, макрогол 6000, макрогол 400, железен оксид (червен) (E 172), титанов диоксид (E 171), талк.

Лекарствена форма и количество в една опаковка

Таблетка за перорално приложение с удължено освобождаване.

Всяка опаковка Коринкер съдържа 20 таблетки nifedipine 20 mg с удължено освобождаване.

Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба

“Чайка фарма – висококачествените лекарства” АД
гр. Варна 9000, “Н.Й.Вапцаров” № 1, България

Име и адрес на производителя

“Чайка фарма – висококачествените лекарства” АД
гр. Варна 9000, “Н.Й.Вапцаров” № 1, България
или “Чайка фарма – висококачествените лекарства” АД
бул. Санкт Петербург № 53. гр. Пловдив 4000
България

Фармакотерапевтична група

Калциев антагонист

Терапевтични показания

- Лечение на стабилна ангина пекторис (стенокардия при усилие);
- Лечение на есенциална и симптоматична хипертония.

Противопоказания

В какви случаи не трябва да приемате Коринкер?

Коринкер не трябва да се употребява при:

- установена свръхчувствителност към лекарственото вещество nifedipine;
- установена свръхчувствителност към помощните вещества;
- бременност и кърмене;
- шок от сърдечно-съдов произход;
- високостепенна аортна стеноза;



- нестабилна ангина пекторис;
- остър сърдечен инфаркт (в рамките на първите 4 седмици);
- приложение в комбинация с rifampicin.

Предпазни мерки и специални предупреждения при употреба

Лекарственият продукт се прилага с изключително внимание при:

- пациенти със систолично налягане под 90 mm Hg;
- едновременна употреба на Коринкер с бета-блокери;
- при пациенти с изявена сърдечна недостатъчност;
- при поява на гръдна болка – стенокардия в рамките на 4 часа след приемането на лекарствения продукт;
- едновременна употреба на Коринкер и на сърдечния гликозид digoxin;
- пациенти на диализа със злокачествена хипертония и необратимо увреждане на бъбречната функция;
- пациентите с ограничена чернодробна функция;
- пациенти със съпътстващи тежки стеснения на гастро-интестиналния тракт.

Лекарствени взаимодействия и други форми на взаимодействия

Кои други лекарствени продукти повлияват действието на Коринкер или биват повлиявани от него?

- Коринкер може да се прилага в комбинация с бета блокери и други антихипертензивни лекарства. Изисква се повишено внимание поради възможност от поява на хипотония и/или развитие на сърдечна недостатъчност.
- Коринкер не трябва да се прилага едновременно с rifampicin, тъй като може да не се постигнат ефективни плазмени концентрации на nifedipine.
- Антихипертензивният ефект на Коринкер се потенцира от едновременното приложение с cimetidine.
- При комбиниране с quinidine плазмените нива на последния се понижават, независимо от дозата на quinidine.
- При едновременно лечение с digoxin плазменото ниво на digoxin може да се увеличи. Поради това то трябва да се следи и при необходимост дозата на digoxin да се намали.
- Diltiazem води до повишаване на плазмените нива на nifedipine. Изисква се повишено внимание и намаляване на дозата на Коринкер при необходимост.
- Phenytoin намалява бионаличността на nifedipine и по този начин отслабва ефективността му. При необходимост да се повиши дозата на Коринкер.
- Когато Коринкер и chinidine се прилагат едновременно, концентрацията на chinidine се намалява. Поради тази причина, ако е необходимо, се препоръчва коригиране на дозата на chinidine.
- Едновременното приложение на cisapride и Коринкер може да доведе до повишаване на плазмените концентрации на nifedipine. При едновременно приложение на двата продукта трябва да се мониторира артериалното налягане и, ако е необходимо, да се редуцира дозата на Коринкер.



Какви хранителни продукти и напитки трябва да избягвате?

Коринкер не трябва да се приема заедно със сок от грейпфрут поради повишаване на плазмените концентрации на nifedipine. Избягвайте прекомерната употреба на алкохол, тъй като той може да усилва понижавачото кръвното налягане действие на Коринкер и с това да предизвика световъртеж и други симптоми.

Какво трябва да имате предвид по време на бременност и кърмене?

Поради това, че резултатите от проведени изследвания с животни са доказали увреждане на плода (аномалии), Коринкер не трябва да се приема по време на бременността. Липсва достатъчен опит при приложението му по време на бременност при хора.

Лекарственото вещество на Коринкер се екскретира в майчиното мляко. Тъй като липсват достатъчно данни за възможното действие върху кърмачета, трябва да се спре кърменето, ако през това време лечението с Коринкер е наложително.

Какво трябва да се има предвид при деца?

Това лекарство обикновено не се предписва на деца.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

В началото на лечението или при употреба на алкохол, за период от време, който се определя индивидуално, шофирането и извършването на дейности с повишен риск от инциденти са нежелателни.

Дозировка, начин и продължителност на приложение

Следвайте стриктно инструкциите на лекуващия лекар!

В какво количество и колко често трябва да приемате Коринкер?

1. Есенциална и симптоматична хипертония

Лечението се провежда със средна дневна доза от 2 пъти дневно по 20 mg (2 пъти дневно по 1 таблетка с удължено освобождаване).

Ако се налага по-висока дозировка, това трябва да става с постепенно повишаване на дневната доза до максимум 2 пъти дневно по 40 mg (2 пъти по 2 таблетки с удължено освобождаване) на всеки 12 часа.

1. Стабилна ангина пекторис

Лечението се провежда със средна дневна доза от 2 пъти по 20 mg (2 пъти дневно по 1 таблетка с удължено освобождаване).

Ако се налага по-висока дозировка, това трябва да става с постепенно повишаване на дневната доза до максимум 2 пъти дневно по 40 mg (2 пъти по 2 таблетки с удължено освобождаване) на всеки 12 часа.

Употребата на Коринкер не е препоръчителна при деца.

Как трябва да приемате Коринкер?



Таблетките трябва да се приемат с достатъчно течност, без да се дъвчат или чупят.

Колко дълго трябва да приемате Коринкер?

Лечението с Коринкер може да продължи неограничено време. Продължителността на лечението се определя от лекуващия лекар.

Предозиране

Какво трябва да направите, ако сте приели Коринкер в много големи количества?

При прием на много големи количества Коринкер може да се стигне до рязко спадане на кръвното налягане, загуба на съзнание, забавена или ускорена сърдечна честота, повишено ниво на кръвната захар, сърдечна недостатъчност, недостиг на кислород.

Извикайте веднага лекар! Той ще определи какви мерки да предприеме срещу предозирането в зависимост от проявените симптоми.

Нежелани лекарствени реакции

Какви нежелани лекарствени реакции могат да се проявят при прием на Коринкер?

Най-често срещаните нежелани лекарствени реакции са: периферен отток, световъртеж, главоболие, умора, сърцебиене, зачервяване, чувство за топлина и гадене. Възможни са: болка в гърдите, понижено кръвно налягане, сърцебиене, диария, нарушени чернодробни тестове, запек, болка в мускулите, нервност, изтръпване на крайниците (мравучкане), треперене, задух, сърбеж, обрив, нарушения в зрението, повишаване на дневната екскреция на урина. Рядко са възможни: гърдна жаба (стенокардия), прилошаване (синкоп), стомашно-чревни нарушения (тежест).

При пациенти на диализа със злокачествена хипертония и хиповолемия може да се появи значително понижаване на кръвното налягане в резултат на разширяването на кръвоносните съдове (вазодилатация).

Какви мерки трябва да се предприемат при нежелани лекарствени реакции?

Моля, информирайте Вашия лекар за всички появили се при Вас нежелани лекарствени реакции, при което той ще вземе необходимите мерки!

Специални условия за съхранение

Да се съхранява на защитено от светлина и влага място, недостъпно за деца.

Срок на годност

Срокът на годност е отбелязан върху опаковката. Не употребявайте след посочената дата!

Дата на последна редакция на тази листовка

Май, 2004 г.

