

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

LENDACIN fl. 1g, 250mg ЛЕНДАЦИН фл.1г, 250 мг

Съдържание на натрий 83mg/g или 3,6 mval/g

Показания

Lendacin се използва за лечението на бактериални инфекции на различни органи и системи. Lendacin се отпуска само с рецептa и се прилага в инжекционна форма.

Противопоказания

Въпреки, че решението за лечение с този антибиотик се взима само от Вашия лекуващ лекар, за Вас е важно да го информирате ако имате свръхчувствителност към цефалоспоринови и/или пеницилинови антибиотици, в случай че знаете за такива.

Бременност и кърмене

Независимо, че не е доказан ефекта върху плода, както и нежелани ефекти у деца в кърмаческа възраст, не е желателна употреба на препарата от бременни и кърмачки.

Несъвместимост

Не е желателно смесването на Lendacin с други антимикробни агенти или инфузионни разтвори, поради опасност от несъвместимост.

Нежелателни лекарствени реакции

Терапията с цефтриаксон може да предизвика следните странични ефекти:

- ◆ гастроинтестинални - (диария, гадене, повръщане, стоматит, псевдомемброзен колит)
- ◆ кожни - екзантем, алергичен дерматит, пруритус, обрив
- ◆ хематологични - тромбоцитоза, еозинофилия, левконения, тромбоцитопения, хемолитична анемия
- ◆ локална реакция - болка, флебит могат да възникнат на мястото на инжекция.

○ **Приложение и дозировка**

Дозировката се определя от лекуващия лекар. Ако не е предписано друго се дава на;

- възрастни и деца над 12 години: обичайната доза е 1 до 2 ~~мг~~^Г един път на ден (разделено в две еднакви дози) на 12 часа. Поява на локална инфекция се избягва чрез инжектиране на две различни места.

Най-високата доза е 4 ~~мг~~^Г. В такъв случай цефтриаксон се прилага на всеки 12 часа посредством интравенозна инфузия с продължителност 30 минути.

Деца до 12 години: обичайната дневна доза е 50 до 75 мг/кг телесно тегло (или на всеки 12 часа разделено на две еднакви дози). Дневна доза не бива да е по-голяма от 2 ~~мг~~^Г.

Назначението става след проба за свръхчувствителност.

Времетраенето на лекуването е в зависимост от инфекцията. Болните лекуваме още най-малко 3 дни след изчезване на симптомите.

Цефтриаксон се прилага интрамускулно, интравенозно и в интравенозна инфузия с продължителност най-малко 30 минути.

За интрамускулно приложение се разтваря 250 мг цефтриаксон в 2 мл едно процентов разтвор на лидокаин (след предварително тестване за алергия) или 1 г в 3,5 мл едно процентов разтвор на лидокаин. Инжектирането се прави дълбоко в задния мускул.

За интравенозно приложение разтваряме 250 мг цефтриаксон в 5 мл вода за инжекции или 1 г в 10 мл вода за инжекции. Впръсква се директно във вената - бавно в продължение 2 до 4 минути.

За интравенозна инфузия се разтваря 2 ~~мг~~^Г цефтриаксон в 40 мл инфузионен разтвор, който не съдържа калций (0.45 или 0.9 процентов натриев хлорид, 2.5-, 5- или 10-процентова глюкоза, 5-процентова левулоза, 6-процентов декстрлан в глюкоза). Инфузията се прилага най-малко 30 минути.

Съхранение

Лекарството съхраняваме на тъмно място при температура до 25 градуса Целзий.

Приготвения разтвор се употребява до 6 часа, ако е съхраняван на температура до 25 градуса Целзий и 24 часа ако е съхраняван в хладилник (с температура от 2 до 8 градуса Целзий)

Срок на годност

1. Да не се употребява след изтичане на срока на годност.
2. Срокът е означен върху опаковката.
3. Да се пази далеч от достъпа на деца.