

**Информация за пациента. Моля, прочетете внимателно !**

## **Loratadin 10 - SL**

## **Лоратадин 10 - СЛ**

### **Състав**

Активно вещество: Лоратадин (Loratadine) 10 mg в 1 таблетка.

Помощни вещества: лактоза, микрокристална целулоза, калциев стеарат.

### **Действие**

Препаратът облекчава симптомите на алергия. Приет в обичайната доза, Лоратадин 10 - СЛ не оказва влияние върху централната нервна система.

### **Показания**

Препаратът се използва при сенна <sup>хрема</sup> треежа и хронични алергични ринити, алергичен конюнктивит и алергични кожни реакции. Облекчава сърбежа, зачервяването, както и броя и размера на кожните обриви.

Лоратадин 10 - СЛ може да се прилага при възрастни, юноши и деца над 3-годишна възраст.

### **Противопоказания**

Препаратът не трябва да се прилага при доказана свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

Употребата му при деца под 3-годишна възраст, по време на бременност и кърмене не се препоръчва.

В случай, че някое от гореописаните състояния се появи по време на лечението, необходимо е да се обърнете към Вашия лекуващ лекар.

### Нежелани лекарствени реакции

Препаратът обикновено се понася добре, но е възможно да се появят гастроинтестинални реакции, (гадене, липса на апетит или вълчи апетит, увеличаване на телесното тегло), замаяност, умора, слабост, главоболие, при високи дози – сънливост, в изключителни случаи може да се появят сухота в устата и алергични кожни реакции (зачервяване на кожата). В случай на поява на нежелани лекарствени реакции или други необичайни реакции, необходимо е да се посъветвате с Вашия лекар относно по-нататъшната употреба на препарата.

### Лекарствени взаимодействия

Действието на Лоратадин 10 – СЛ и на други препарати, използвани едновременно може взаимно да се повлияе. Вашият лекар трябва да бъде информиран относно всички лекарствени средства, които приемате едновременно или ще започнете да вземате, независимо дали по лекарско предписание или свободно продаваеми. Не е доказано засилване на действието на алкохола при едновременна употреба с лоратадин, въпреки това, употребата на алкохолни напитки по време на лечението с препарата не се препоръчва.

### Дозировка и начин на приложение

Дозировката и продължителността на лечението винаги се определя от лекар. Обичайната дневна доза при възрастни и деца над 12 години (телесно тегло над 30 kg) е 1 таблетка един път дневно. Дневната доза за деца от 3 до 12 години (с телесно тегло под 30 kg) е ½ таблетка веднъж дневно. При тежки нарушения на бъбречната или чернодробна функция, индивидуалната дозировка трябва да се адаптира – обикновено ½ таблетка дневно или 1 таблетка през ден.

Ако пропуснете една доза и интервалът от време до следващата доза не е голям, вземете я веднага след като сте се сетили, а следващата доза се приема в обичайното време. Ако времето между приемите е прекалено дълго, вземете следващата обичайна доза (не увеличавайте дозата!). Не спирайте приема на препарата без да сте се посъветвали с лекар.

### Начин на приложение

Таблетките се приемат поне 1 час преди хранене или 2 часа след хранене, с достатъчно количество течност.

### **Предпазни мерки**

При приемане в обичайната дозировка, препаратът не повлиява бдителността и времето за реагиране. Приемането на по-високи дози може да повлияе неблагоприятно дейности, изискващи повишено внимание, (управление на моторни превозни средства, работа с машини, работа на височини), особено при наличие на умора или замаяност. Тези дейности могат да се извършват само след съгласието на лекар.

Ако трябва да се направят тестове за кожна чувствителност, приложението на Лоратадин 10 – СЛ трябва да се прекъсне поне 2 дни преди провеждането на тези тестове.

### **Предозиране**

В случай на предозиране или инцидентно приемане на препарата от дете, трябва незабавно да се обърнете към лекар.

### **Лекарствена форма и опаковка**

Таблетки по 10 броя в опаковка.

Таблетки по 30 броя в опаковка

### **Съхранение**

На сухо място, при температура до 25° C , защитено от светлина.

### **Срок на годност**

5 години.

### **Внимание**

Препаратът да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Да не се употребява след срока на годност, посочен върху опаковката.

### **Производител**

SLOVAKOFARMA a. s.

Nitrianska 100

920 27 Hlohovec, Slovak Republic

Адрес за контакти

Словакофарма - България ООД

Ул. "Голо бърдо" No 22

София 1407

Последна редакция на текста: Май 1999 г.