

Указание за употреба!

ПРОТАМИН СУЛФАТ (PROTAMIN SULFAT)

Инжекции

Антагонист на хепарина

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Приложение към
разрешение за употреба №

618/05.03.02, *Велич*

Какво съдържа Протамин сулфат?

1 ампула от 5 мл съдържа:

| | |
|------------------|---------|
| Protamini sulfas | 50 mg |
| натриев хлорид | 0.9% |
| фенол | 12.5 mg |
| сярна киселина | q.s. |
| вода за инжекции | до 5 мл |

За какво се употребява Протамин сулфат?

Протамин сулфат е ефикасен антагонист на хепарина в еквивалентни количества / 1 мг Протамин сулфат неутрализира 1 мг хепарин/. Действието настъпва моментално, а ефектът трае около 2 часа. Протамин сулфат се използва за лечение на предозиране с хепарин, като се свързва с него и образува неактивен комплекс.

Необходимо е този антидот да бъде под ръка, когато се инжектира хепарин, за да се неутрализира неговото нежелани действие при необходимост.

Какво трябва Вашият лекар да знае преди да употреби Протамин сулфат?

Той трябва да знае дали:

- Си инжектирате инсулин, съдържащ протамин
- Дали сте вазектомиран
- Имате необикновени или алергични реакции към протамин, риба, други лекарства, храни или консерванти.
- Сте бременна или планирате бременност.
- Кърмите.

Как да се използва Протамин сулфат?

Протамин сулфат е за бавна инфузия във вените. Той се прилага от специалисти във болнично заведение.

Как други лекарства могат да взаимодействуват с Протамин сулфат?

Кажете на Вашия лекар: за всички лекарства, които вземате дори неназначените медикаменти; за това дали често използвате напитки с кофеин или алкохол; дали пушите; дали употребявате наркотици. Това може да повлияе на начина на действие на Вашето лекарство. Консултирайте се с лекаря преди да спрете или да започнете лечение с някое лекарство.

Нежелани лекарствени реакции

- Болки в гръдния кош или задух.
- Трудно дишане, хрипове, кашлица
- Замаяност, леко главоболие.
- Зачервяване или усещане за топлина.
- Гадене и повръщане.
- Обрив и сърбеж.
- Неочаквано кървене.

Кога не трябва да се използва Протамин сулфат?

При свръхчувствителност към активната съставка.

Как трябва да се съхранява лекарството?

Да се съхранява на тъмно.

Изхвърлете лекарството, ако е изтекъл срока на годност!

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Притежател на разрешителното за употреба

GALENIKA a.d.

Batajnicki drum b.b.

11 080 Zemun-Belgrade, Yugoslavia

tel/fax: +38111612172

Дата на последната редакция на листовката:

Май 2001