

И А Л  
ОДОБРЕНО!  
ДАТА ..... 19. 11. 06

**ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА**  
**REHYDRIN®**  
**РЕХИДРИН**

**СЪСТАВ**

Лекарствени вещества в едно саше:

Sodium chloride 875 mg

Potassium chloride 625 mg

Sodium citrate 337 mg

Glucose anhydrous 2500 mg

Citric acid anhydrous 225 mg

Помощни вещества: метил парахидроксибензоат, захарин натрий, лимонова есенция, оцветител (E104).

**ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА**

Гранули за перорален разтвор в саше 4.6g, 20 сашета в картонена кутия.

**ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

Балканфарма-Троян АД,

Ул. Крайречна № 1

Тел. (0670) 22 607

**ДЕЙСТВИЕ**

Rehydrin е солева комбинация, която се прилага за възстановяване на водно-солевия баланс на организма при обезводняване. Отделните съставки играят важна роля в регулирането на функциите на сърдечно-съдовата, нервната и отделителната система.

**ПОКАЗАНИЯ**

Лекостепенно до умерено обезводняване при повръщане и диарии с различен произход.

**ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА**  
**ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ**

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

- свръхчувствителност към някои от съставките на продукта;
- тежка бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс под 30 ml/min);
- захарен диабет (инсулинозависим и неинсулинозависим).

**СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА**

няма

## **ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

Алдостероновете антагонисти, калий-съхраняващите диуретици, ACE - инхибиторите повишават кръвните нива на калия. Да се употребяват с повишено внимание съвместно с Rehydrin.

Действието на дигиталисовите продукти намалява при съвместно приложение с Rehydrin, поради по-високите плазмени нива на калия.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ПАЦИЕНТИ**

При кърмачета и малки деца лечението да се провежда под лекарски контрол и проследяване на серумните концентрации на натрий и калий.

Да се прилага с повишено внимание при пациенти с тежка сърдечна недостатъчност, тежка артериална хипертония и повишени нива на калия в кръвта.

## **БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ**

Липсват данни за безопасно приложение на продукта по време на бременност и кърмене.

## **ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ**

Не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

## **ДАНИ ЗА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА**

Готовият продукт съдържа метил парахидроксibenзоат и може да причини алергични реакции от забавен тип (уртикария, контактен дерматит).

## **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА**

### **ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА УПОТРЕБА**

Перорално. Без лекарско предписание при възрастни и деца над 12 години. Съдържанието на едно саше се разтваря в 200 ml вода.

*Кърмачета и малки деца:* по 1-2 чаени лъжички на всеки 5-10 минути в продължение на 4-6 часа. Общото количество при леко протичащи диарии е 40-50 ml/kg дневно. При по-тежко протичане дневното количество може да достигне до 80-100 ml/kg. Лечението продължава до прекратяване на диарията и възстановяване на водно-електролитния баланс.

*Възрастни и деца над 12 години:* по 100 ml на час през първите 8 часа и след това по 160 ml на час за следващите 10 часа, до общо 2400 ml за първото денонощие. След това лечението продължава според промените в клиничното състояние.

## **ПРЕДОЗИРАНЕ**

При данни за предозирание се спира приема на продукта и се провежда форсирана диуреза (при контрол на водния и електролитния баланс), а при

необходимост и хемодиализа (след стомашна промивка с медицински въглен).

#### **НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ**

Рядко може да се наблюдават стомашно-чревни смущения – гадене, повръщане, диария.

#### **СЪХРАНЕНИЕ**

На сухо и защитено от светлина място, при температура под 25<sup>0</sup>С.  
Да се пази на място, недостъпно за деца!

#### **СРОК НА ГОДНОСТ**

2 (две) години от датата на производство.

Продуктът не трябва да се употребява след изтичане на срока на годност, обозначен върху опаковката.

#### **ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ**

юли, 2002