



Strepsils® Lemon Sugar Free
Стрепсилс Лимон без захар

Таблетки за смучене
Информация за пациента.

Какво съдържа Стрепсилс Лимон без захар?

Активни съставки :

Amylmetacresol 0,6mg и 2,4 – Dichlorobenzyl alcohol 1.2mg

Помощни вещества: винена киселина, захарин, с аромат на лимон, малтитол ликвид, изомалт и оцветител E104

Как Стрепсилс Лимон без захар действа?

Стрепсилс Лимон без захар облекчава симптомите при инфекции на устната кухина и гърлото.

Активните съставки 2,4 Дихлорбензил алкохол и Амилметакрезол имат антисептично действие и са ефективни срещу широк спектър от бактерии, познати като причинители на възпалителни заболявания в устната кухина и гърлото.

Стрепсилс Лимон без Захар е подходящ за диабетици.

Прочетете преди да започнете да взимате Стрепсилс Лимон без захар:

Не се препоръчва при алергия към някоя от съставките.

Как да взимате Стрепсилс Лимон без захар таблетки?

Приложение: За перорална употреба.

За възрастни и деца – по една таблетка се смуче бавно на всеки 2-3 часа.

Отпуска се без лекарско предписание.


Нежелани ефекти:

В изключително редки случаи може да се появи кожен обрив, чувство на изтръпване и парене в устата и затруднения при преглъщане. При поява на някой от тези симптоми е необходимо да уведомите Вашия лекар или фармацевт.

При прекомерна употреба помощното вещество-изомалт може да има лек разхлабващ ефект.

Предупреждение: Не превишавайте посочената доза.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.



Помнете: Родител трябва да наблюдава употребата на лекарствения продукт при по-малки деца, тъй като те могат да се задавят.

За бременни и кърмещи преди употреба на лекарствения продукт е задължителна консултацията с лекар или фармацевт.

Консултирайте се с лекар, ако симптомите продължават повече от 5 дни при възрастни и повече от 3 дни при деца или са придружени с висока температура и главоболие.

Предозиране е малко вероятно и би могло само да причини стомашночревен дискомфорт.

Да не се използва след изтичане срока на годност.

Да не се употребява, ако фолиото на блистера е наранено.

Да се съхранява под 30°C

Опаковката съдържа 16 таблетки за смучене.

Производител и притежател на разрешителното за употреба:

Boots Healthcare international

Nottingham NG2 3 AA

Великобритания

Последна редакция на текста:

21.09.2005

