

80
10-12.05/

TROXERUTIN VRAMED gel

ТРОКСЕРУТИН ВРАМЕД гел

(листовка за пациента)

СЪСТАВ НА ЕДНА ОПАКОВКА:

Активно вещество:

Troxerutin 20 mg/1g

Помощи вещества:

Карбопол 940, Динатриев едетеат, Бензалкониев хлорид, Натриева основа 30%, Пречистена вода.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАЧЕТО	
Приложение към разрешение за употреба №	
N-10/ 14.12.01	E. A. M.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

gel

ФАРМАКОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ

Троксерутинът принадлежи към група медикаменти, наречени вазопротектори /предпазват вените и капилярите/. Troxerutin Vramed gel намалява подуването на краката и свързаните с него симптоми.

ПОКАЗАНИЯ:

Troxerutin Vramed gel се прилага при хронична венозна недостатъчност и свързаните с нея симптоми на болка, тежки крака, както и болка след склеротерапия. Намалява болката и отока от травматичен произход като изъриване или мускулна контузия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Свръхчувствителност към троксерутин или някое от помощните вещества.

Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба:

Продължителната употреба на лекарства за локална употреба може да доведе до свръхчувствителност!

Ако оплакванията продължават или състоянието Ви се влошава, обърнете се към лекуващия лекар!

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ:

В редки случаи могат да се появят зачервяване на кожата и сърбеж.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

Не са наблюдавани клинично значими лекарствени и други взаимодействия.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА:

Бременност и кърмене

Няма данни за увреждащ ефект върху плода и за екскреция с кърмата при дермално приложение на Troxerutin Vramed gel. Може да се използва през второто и третото тримесечие на бременността и по време на кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:

Няма данни за въздействие на лекарството върху способността за шофиране и работа с машини.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА:

Ако няма друго лекарско предписание се препоръчват следните дозировки:

Гелът се нанася сутрин и вечер върху засегнатите участъци от кожата, като леко се масажира до пълното му проникване.

СЪХРАНЕНИЕ:

При стайна температура под 25°C, на защитено от пряка слънчева светлина място.

СРОК НА ГОДНОСТ:

5 (пет) години

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се употребява след изтичане на маркирания върху опаковката срок на годност!

**Производител: ВРАМЕД АД,
с. Врабево, Ловешка област**

Редакция на листовката: 14.11.2001 г..