

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

АЛЕРЗАН - ЧАЙКАФАРМА
(Cetirizine/Цетиризин)
филмирани таблетки

Прочетете внимателно тази листовка, преди да започнете да използвате това лекарство.

Ако имате допълнителни въпроси, моля обръщайте се към Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано лично на Вас и не бива да го давате на други пациенти, защото може да им навреди, дори и да имат същите симптоми като Вашите.

Състав

● Лекарствено вещество: cetirizine/цетиризин (10mg) във всяка филмирана таблетка.

Помощни вещества: лактоза, царевично нишесте, повидон, магнезиев стеарат, хидроксиметилпропилцелулоза, макрогол, талк, титаниев диоксид, диметикон емулсия

Фармакологична група

Антихистаминов лекарствен продукт, потискащ реакцията на свръхчувствителност.

Характеристика

Лекарственото вещество Cetirizine в продукта Алерзан - Чайкафарма, е антихистаминов лекарствен продукт с продължително действие. Антихистаминовите лекарствени средства блокират действието на хистамина, едно от веществата, отделяни от организма при реакция на свръхчувствителност (алергия). Cetirizine блокира както началната фаза на алергичната реакция, предизвикана от хистамина, разпространението на възпалителни клетки, (като например, еозинофили), така и отделянето на агенти-причинители на по-късна алергична реакция.

● Алерзан - Чайкафарма е високоефективен, антихистаминов и антиалергичен лекарствен продукт, предизвикващ минимална сънливост след обичайната терапевтична доза. Благодарение на продължителното си действие, Алерзан - Чайкафарма може да се приема веднъж дневно от възрастни и деца над 6 годишна възраст.

Показания


Алерзан - Чайкафарма облекчава симптомите на алергичния ринит и конюнктивит (включително целогодишен и сезонен), както и алергични реакции на кожата, придружени от сърбеж и обриви, особено обривите при уртикария (копривна треска).

Дозировка

Дозировката трябва винаги да се определя от лекар. Усвояването на Алерзан - Чайкафарма не се влияе от поемането на храна и следователно може да се използва независимо от храненето.

Възрастни и деца над 12 години: По 1 филмирана таблетка Алерзан - Чайкафарма дневно.

Деца на възраст между 6 и 12 год.: по правило приемат 1 филмирана таблетка веднъж дневно или 1/2 филмирана таблетка два пъти дневно, сутрин и вечер.



Деца под 6 год.: таблетките Алерзан - Чайкафарма не са предназначени за тази възрастова група.

Дозирането при възрастни пациенти или пациенти с остри чернодробни и бъбречни смущения може да бъде променено от лекуващия лекар.

При болни с бъбречна недостатъчност дозировката трябва да се намали до половината от обичайно препоръчаната доза.

Вземете лекарството веднага, ако установите, че сте пропуснали доза. Ако времето за следващата доза наближи, избягвайте дублиране и продължете според редовната схема.

Приемайте таблетките с малко течност.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ДРУГИ

Несъвместимост

Алерзан - Чайкафарма не се препоръчва при пациенти с изявена свръхчувствителност към cetirizine, hydroxyzine или към някое от помощните вещества. Не се препоръчва употребата му от бременни или кърмачки.

Нежелани лекарствени реакции

Като цяло поносимостта към Алерзан - Чайкафарма е добра. Рядко следните нежелани лекарствени реакции могат да се свържат с приемането на лекарствения продукт: главоболие, сънливост, световъртеж, сухота в устата и стомашно-чревен дискомфорт. Ако се появят тези нежелани ефекти или други необичайни реакции, консултирайте се с Вашия лекар за продължаване употребата на продукта.

Макар и рядко, могат да възникнат реакции на свръхчувствителност към лекарството (уртикария, оток на меките тъкани, задух). В такъв случай прекратете веднага приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар за продължаване на лечението.

Бременност и кърмене

Не се препоръчва приема на този лекарствен продукт от бременни, както и от кърмачки, тъй като Алерзан - Чайкафарма се екскретира в млякото.

Взаимодействия


При едновременен прием на Алерзан - Чайкафарма и други лекарства може да се наблюдава потенциране на ефектите им. Поради това, Вашият лекар трябва да е осведомен за всички лекарства, които приемате, с или без рецепта.

Не приемайте други лекарства отпускани без рецепта едновременно със Алерзан - Чайкафарма, освен ако нямате лекарска препоръка. Ако друг лекар Ви предпише друго лекарство, информирайте го, че вече приемате Алерзан - Чайкафарма.

Взаимодействие на Cetirizine с алкохол (при кръвно ниво 0.8 g/l) не е констатирано. Въпреки това не се препоръчва приемането на големи количества алкохол по време на лечението със Алерзан - Чайкафарма.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Пациенти, възнамеряващи да шофират, и тези които извършват потенциално опасни дейности или работят с машини, не трябва да превишават препоръчаната доза и да имат предвид приема на лекарството при извършване на тези дейности. При тези пациенти, едновременната употреба на алкохол или лекарствени средства потискащи ЦНС може да



причини допълнително понижение на вниманието и да наруши изпълнението на посочените по-горе дейности.

Предозиране

При предозиране (повече от 5 филмирани таблетки наведнъж), основният симптом е сънливост. При деца, в резултат от предозиране могат да се проявят раздразнителност и безпокойство.

При предозиране (особено при деца) е необходимо незабавно да потърсите лекарска помощ. В случай на масивно предозиране трябва да се направи промивка на стомаха и да се приложат обичайните поддържащи мерки. Засега не е познат специфичен антидот.

Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба:

“Чайка фарма – висококачествените лекарства” АД
“Н.Й.Вашцаров” №1, гр. Варна 9000, България

Име и адрес на производителя:

“Чайка фарма – висококачествените лекарства” АД
“Н.Й.Вашцаров” №1, гр. Варна 9000, България
или
“Чайка фарма – висококачествените лекарства” АД
бул. Санкт Петербург № 53, гр. Пловдив 4000, България

Срок на годност:

Продуктът не трябва да се използва след изтичане срока на годност, посочен върху опаковката.

Условия на съхранение

Да се съхранява на сухо място, недостъпно за деца, при температура под 25 °С.

В случай на поглъщане на голяма доза, или случайно поглъщане на филмираните таблетки от дете, потърсете лекарска помощ.

Вид и съдържание на опаковката:

10 филмирани таблетки или 20 филмирани таблетки поставени в картонена кутия в блистери по 10 таблетки.

Дата на последна редакция на листовката:

Ноември 2004г.

