

ZANTAC™

ЗАНТАК

Филмирани таблетки 300 mg

ranitidine hydrochloride

Тази листовка се отнася само за ZANTAC. Моля, прочетете я внимателно преди да започнете приема на лекарство. Тя ви информира за най-важното относно лекарството.

Наименование на лекарството

Името на лекарството е ZANTAC.

Какво представлява и какво съдържа лекарството

Фармацевтичната форма на продукта е филмирани таблетки, съдържащи активното вещество ranitidine (ранитидин) под формата на ranitidine hydrochloride. Всяка таблетка съдържа 300 милиграма ranitidine (под формата на ranitidine hydrochloride).

Лекарството съдържа и помощни вещества, необходими да се направи филмираната таблетка: микрокристална целулоза (E460), магнезиев стеарат, хидроксипропилметил целулоза (E464), триацетин и титанов диоксид (E171).

Количество в опаковката: 10 таблетки.

Как действат таблетките

ZANTAC съдържа ranitidine - продукт от групата на т. нар. H₂ антагонисти. Той намалява количеството киселина в стомаха, затова се използва за:

- лечение и предотвратяване на язва на стомаха или и на дванадесетопръстника;
- при отстраняване на инфекцията, причинена от бактерията *Helicobacter pylori*, винаги заедно с антибиотик;
- гастро - езофагеална рефлуксна болест;
- рефлукс - езофагит;
- хроничен обострен панкреатит.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПРИЕМА НА ТАБЛЕТКИТЕ...

Преди да започнете приема на Zantac трябва да си зададете следните въпроси:

- Известно ли Ви е да сте алергични към ZANTAC, ranitidine или друга съставка на продукта;
- Бременна ли сте, планирате ли скорошна бременност;
- Кърмите ли;
- Казвал ли Ви е лекарят, че бъбреците Ви не функционират добре или че трябва да спазвате безсолна диета;
- Известно ли Ви е, че имате някое от редките заболявания като фенилкетонурия или порфирия?

Ако отговорът на някой от гореизброените въпроси е ДА, консултирайте се с лекар преди да започнете приема.

Как да приемате таблетките

Приемайте таблетките така, както Ви е предписал лекуващият лекар.

Лекарят определя дозировката и продължителността на лечението.

Важно е лекарството да бъде приемано точно в определеното време.

Обичайната дозировка е една таблетка от 300 mg вечер преди лягане, или два пъти по 300 mg (сутрин след хранене и вечер в 22 часа).

При лечение на хеликобактерната инфекция на стомашната лигавица дневната доза е два пъти по 300 mg за 7 до 10 дни, заедно с антибиотика.

СЛЕД КАТО ЗАПОЧНЕТЕ ПРИЕМА НА ТАБЛЕТКИТЕ...

След няколко дни трябва да се почувствате по-добре, но не спирайте да приемате таблетките, защото болката или дискомфортът могат да се появят отново.

При повечето хора, които приемат това лекарство, то не създава проблеми. Както при повечето лекарства, някои могат да почувстват нежелани лекарствени реакции.

Листовка за пациента

Какво да направите, ако пропуснете една доза

Ако сте забравили да приемете някоя доза, не се безпокойте. Приемете дозата веднага след като си спомните и продължете приемането на следващите дози точно според определеното време. Ако обаче е приближило времето за следващия прием, изчакайте до неговото настъпване и приемете направо следващата доза! Не приемайте двойна доза!

Какво да направите, ако сте приели твърде много таблетки

Придържайте се към препоръчаната Ви дозировка. Малко вероятно е приемането на повече таблетки да създаде опасност за Вас, освен ако не сте приели твърде много таблетки наведнъж, или ако сте на безсолна диета (с малко натрий). В такъв случай незабавно потърсете лекар или повикайте бърза помощ!

Допълнителна информация за ZANTAC:

Нежелани лекарствени реакции

Наред с полезния си ефект лекарството може да причини и нежелани ефекти. Безопасността на ranitidine е установена от широката му употреба по света повече от десет години и според повечето хора, които го приемат, то не им създава проблеми. Въпреки това, подобно на всяко друго лекарство, то може да доведе до нежелани реакции.

Някои хора са алергични към определени лекарства. Ако скоро след като сте започнали да приемате таблетките се появят някои от следните ефекти, **СПРЕТЕ** лекарството и незабавно уведомете лекаря:

- внезапно хрипене или стягане в гръдния кош;
- подпухване на клепачите, лицето или устните; с или без неравномерен обрив по кожата някъде по тялото;
- необяснима треска или тръпнене по цялото тяло;
- чувство на прималяване, особено когато ставате.

Консултирайте се с лекар, също така, колкото е възможно по-скоро, ако забележите някои от следните нежелани реакции:

Необичайни:

- главоболие;
- обриви по кожата;
- гадене и загуба на апетит с или без жълтеница;
- обърканост;
- бавен или неритмичен пулс;
- необичайна умора, недостиг на въздух или склонност към инфекции или нараняване, което може да е предизвикано от промени в кръвната картина;
- силна стомашна болка, в редки случаи предизвикана от възпаление на панкреаса;
- диария.

Консултирайте се с лекар още при следващото си посещение, ако забележите някои от следните нежелани реакции:

Редки: болки в мускулите или ставите, потиснатост, халюцинации, повишена чувствителност на гърдите и/или уголемяването им при мъжете.

Понякога лекарят може да ви предпише антибиотици, които причиняват диария.

Ако се чувствате некомфортно или имате необичайно и необяснимо неразположение, уведомете лекаря.

Ако не почувствате облекчение през първата седмица на лечението или почувствате влошаване въпреки лечението, уведомете Вашия лекуващ лекар.

КЪДЕ ДА СЪХРАНЯВАТЕ ТАБЛЕТКИТЕ

Съхранявайте таблетките на сухо място, при температура под 30°C и далече от източници на топлина.

Съхранявайте лекарството на място, недостъпно за деца.

Не употребявайте таблетките след датата на изтичане на срока на годност, посочена върху опаковката.

Листовка за пациента

Кой произвежда лекарството и притежава разрешение за употребата му в България
Филмираните таблетки ZANTAC се произвеждат от Glaxo Wellcome S.A., Aranda de Duero (Burgos), Spain или Glaxo Wellcome S. A., 60-322 Poznan, Poland. Притежател на разрешението за употребата му е Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, UK, представляван в България от Glaxo Wellcome Export Ltd. с адрес: София, кв.Иван Вазов, ул.Димитър Манов бл.10.

Помнете !!!

Това лекарство е за Вас. Никога не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, дори ако техните симптоми са подобни на Вашите.

Тази листовка не Ви дава пълна информация за лекарството.

Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни в нещо, обърнете се към Вашия лекуващ лекар.

Може да Ви се наложи да прочетете тази листовка отново, затова не я изхвърляйте докато не употребите лекарството в опаковката.

ZANTAC е запазена марка на Glaxo Wellcome.