


Листовка за пациента

Троксерутин Ветпром
Troxerutin Vetprom



СЪСТАВ. 1g гел съдържа лекарствено вещество Troxerutin 20 mg и като помощни вещества: Карбомер 940 6 mg, Троламин 7 mg, Динатриев едетат 0.5 mg, Бензалкониев хлорид 1 mg и Пречистена вода 965.5 mg.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА. Гел 2.0% за външно приложение в алуминиеви туби по 40g.

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА. "ВетПром"-АД, 2400 гр.Радомир, България, ул."Отец Паисий" №26.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ. Троксерутин Ветпром притежава венотонично, капиляротонично, обезболяващо и противовъзпалително действие. Намалява повишената пропускливост на капилярите. Антагонизира венодилатативния ефект на хистамина, брадикинина и други медиатори на възпалението. Действа противовъзпалително върху перивенозната тъкан. Намалява отока, отстранява болката, подобрява трофиката и патологичните промени, свързани с венозната недостатъчност.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ. Троксерутин Ветпром се използва при болка и оток следствие на хронична венозна недостатъчност, отекли и тежки крака, оток следствие на травма, мускулни травми, навяхване и изкълчване, болка след вено-склерозираща терапия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Свръхчувствителност към троксерутин или някое от помощните вещества на продукта.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА. Не трябва да се нанася върху лигавици, открити рани и екземи.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. При външно приложение на Троксерутин не са установени.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА ПРИ БРЕМЕНИ И КЪРМЕЩИ. Няма данни за нежелани ефекти върху плода и новороденото. Лекарственият продукт може да се прилага през втория и третия триместър на бременността, както и по време на кърмене.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ. Употребата на продукта не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

НАЧИН НА УПОТРЕБА И ДОЗИРОВКА. Прилага се външно за мазане. Поразеният участък от кожата се намазва сутрин и вечер с малко количество гел. Нанася се и се втрива с леко масажирание отдолу нагоре до окончателното проникване на продукта. Ако по някаква причина е пропуснато използването на продукта, пациентът може по всяко време да извърши манипулацията, като съблюдава интервала между две нанасяния да е не по-малко от 10-12 часа.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРЕДОЗИРАНЕ. Няма опасност от предозирание поради локалното прилагане. При случайно поглъщане на големи количества е необходимо промиване на устната кухина и стомаха, при нужда се провежда симптоматично лечение.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ. Не са установени, освен в редки случаи е възможна появата на зачервяване, сърбеж, кожни обриви. Те преминават бързо след прекъсване на лечението.

СЪХРАНЕНИЕ. При температура под 25°C, на сухо и защитено от пряка светлина място. Да не се замразява! Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

СРОК НА ГОДНОСТ. 5 (пет) години.

Продуктът да не се използва след датата на изтичане срока на годност, посочена върху опаковката.

ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА. Декември 2003г.

