

Парт. № Голем доз:	АНТИМИКО-БЕТА Дермален разтвор	Състав: g/50g: Лекарствени вещества: salicylic acid 2.5, 2-Naphthol 0.5; Помощни вещества: Ацетон 15.65; Глицерол 15.65; Етанол 96 % 14.5; Пречиствена вода 1.2 Показания: в комплексното лечение на дерматомикози Дозировка и начин на приложение: нанася се върху засегнатите участъци с памучен тампон един-два пъти дневно в продължение максимум на десет дни. Противопоказания: саръчувствателност към някои от съставките на продукта, <i>деца до 6 годишна възраст</i> , бременност и кърмене. Нежелани лекарствени реакции: възможна е появата на алергични реакции, дерматити, разязявания на кожата и много рядко появи на нитоксикация от салициловата киселина (световъртеж, гадене, повръщане, психомоторна възбуда, нарушения в дишането) или от 2-нафтаола нарушения на бъбречната функция. При поява на нежелани реакции, лечението да се преустанови и се потърси лекарска помощ. Предупреждения: само за външно приложение. Да не се нанася върху лезивни и наранени кожни повърхности. Да не се нанася върху големи кожни повърхности. Не се препоръчва прилагането му при болни с бъбречна недостатъчност и диабетни с нарушено периферно кръвообращение. Да се пазят очите. Продуктът е лесно запалим. <i>Да се съхранява на място недостъпно за деца.</i> Условия на съхранение: При температура под 25° С на защитено от пряка светлина място
	ANTIMYCO-BETA Cutaneous solution	
	ВЪНШНО ЗА МАЗАНЕ 50g Режим на предписване: без лекарско предписание.	
Рег. №	Производител и притежател на разрешението за употреба: "Тикофарма" ООД, гр. Пещера ул. Дойранска епопея № 5	

М. Платиканова 29.01.04
M. Pinf

Р. Кулаковска 23.02.04
R. K.

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 15-12-2003г

