

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Crestor® Tablets 10 mg and 20 mg (rosuvastatin) Крестор® таблетки 10 mg и 20 mg (росувастатин)

Тази листовка е създадена, за да Ви помогне да извлечете максимална полза от Вашето лекарство. Прочетете тази листовка внимателно преди да започнете да вземате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Тя може да Ви потрябва отново.
- Ако имате допълнителни въпроси, моля попитайте лекуващия си лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас и Вие не трябва да го давате на други. То може да им навреди, дори и ако симптомите им са същите като Вашите.

В тази листовка

1. Какво представлява Crestor и за какво се използва
2. Преди да вземете Crestor
3. Как да вземате Crestor
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Crestor
6. Допълнителна информация


CRESTOR

(ROSUVASTATIN)

Активното вещество на Crestor е rosuvastatin. Crestor филмирани таблетки се предлагат в опаковки съдържащи 10 mg или 20 mg rosuvastatin.

Таблетките съдържат и помощните вещества: лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, калциев фосфат, кросповидон, магнезиев стеарат, хипромелоза, глицерол триацетат, титаниев диоксид (E171), червен железен оксид (E172).

Вашето лекарство е произведено от:
AstraZeneca GmbH, Otto-Hahn-Strasse 68 723, Plankstadt, Germany



Притежател на разрешението за употреба:

AstraZeneca UK Limited, Capability Green, Luton LU1 3LU, UK

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CRESTOR И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

CRESTOR спада към група медикаменти наречени статини (също така известни като инхибитори на ензима 3-хидрокси-3-метилглутарил коензим А-редуктаза (HMG-CoA редуктаза). Предназначен е да намалява високите нива на мазнините в кръвта, наречени липиди (главно холестерол и триглицериди), обикновено, когато диетата или упражненията не могат да се справят. Ако високите нива останат нетретирани, мазнините могат да се натрупат в стените на кръвоносните съдове, които във времето могат да доведат до стесняване на кръвоносните съдове. Това е една от най-често срещаните причини за сърдечните заболявания.

CRESTOR се продава в опаковки по 28 таблетки.

10 mg филмирана таблетка – кръгла, биконвексна, 7 мм, оцветена в розово, със делителна черта от едната страна.

20 mg филмирана таблетка – кръгла, биконвексна, 9 мм, оцветена в розово.

На таблетките е отпечатано “ZD4522” и количеството на лекарственото вещество.

2. ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ CRESTOR

Не вземайте CRESTOR:

- Ако сте алергични към CRESTOR или към някое от помощните вещества или подобни лекарствени продукти
- Ако сте бременна или се опитвате да забременеете
- Ако имате заболяване на черния дроб
- Ако имате тежко бъбречно заболяване
- Ако Ви е съобщено, че страдате от заболяване на мускулите наречено миопатия
- Ако приемате циклоспорин

Ако смятате, че някое от гореспоменатите състояния се отнася за Вас, моля уведомете лекуващия си лекар.

Ако откриете, че сте забременяла по време на лечението с CRESTOR трябва незабавно да преустановите приема и да информирате лекуващия си лекар.

Не вземайте CRESTOR 40 mg:



- Ако имате умерено увреждане на бъбречната функция
- Ако имате проблеми с щитовидната жлеза
- Ако страдате от или имате фамилна обремененост с наследствена мускулна дистрофия
- Ако сте имал(а) мускулно увреждане след прием на понижаващ серумния холестерол медикамент
- Ако консумирате големи количества алкохол
- Ако сте от азиатски произход
- Ако приемате фибрати (лекарства за понижаване на мазнините в кръвта)

Ако смятате, че някое от гореспоменатите състояния се отнася за Вас, моля уведомете лекуващия си лекар.

Обърнете специално внимание на приема на CRESTOR:

Преди да вземете Вашите таблетки, уведомете лекуващия Ви лекар в случай, че:

- Ви е казано, че имате здравословни проблеми с черния дроб или бъбреците.
- Имате проблеми с щитовидната жлеза
- Ако страдате от или имате фамилна обремененост с наследствена мускулна дистрофия
- Имали сте проблеми с мускулите след приемане на други лекарства, които намаляват нивото на холестерола
- Редовно пиете големи количества алкохол
- Вие сте на възраст над 70 години
- Ако приемате фибрати (медикаменти за понижаване на мазнините в кръвта)

Докато вземате Вашите таблетки, моля уведомете лекуващия Ви лекар, ако:

- Страдате от необясними болки в мускулите

Както вече беше споменато, медикаментът съдържа лактоза, която при непоносимост към последната може да предизвика алергична реакция.


Ако постъпите в болница уведомете медицинския персонал, че вземате CRESTOR.

Прием на други лекарства

Кажете на лекуващия си лекар или фармацевта ако вземате някакви други лекарства, включително тези, които може да сте си купили сами. По-специално уведомете Вашия лекар, ако вземате: циклоспорин (често се предписва след трансплантации на органи), варфарин (или друго лекарство за разреждане на кръвта) или гемфиброзил (използван често за понижаване на кръвните липиди).

Ефект върху способността за шофиране и работа с машини

Не се очаква CRESTOR да повлияе неблагоприятно способността за шофиране или работа с машини.



3. КАК ДА ВЗЕМАТЕ CRESTOR

Следвайте инструкциите на Вашия лекар кога и как да вземате Вашите таблетки. Моля, **ПРОЧЕТЕТЕ ЕТИКЕТА** върху опаковката. Попитайте лекаря, медицинската сестра или фармацевта, ако не сте сигурни какво да правите.

Обикновено лечението с CRESTOR започва с 5 или 10 mg веднъж дневно. Дозата от 5 mg можете да получите като разделите таблетката от 10 mg на две.

След проверка на липидите в кръвта, Вашия лекар може да реши да повиши дозата до ниво подходящо за Вашето заболяване. Максималната дневна доза е 40 mg.

Поглъщайте таблетките или техните половинки с вода. Може да вземете таблетката по всяко време на деня със или без храна. Постарайте се да вземете таблетката по едно и също време всеки ден, това ще Ви помогне да не забравяте да я приемате.

Не спирайте употребата на Вашите таблетки, дори и когато се почувствате по-добре, освен ако лекуващият лекар не Ви каже или не забременеете.

Ако забравите да вземете доза:

Не се притеснявайте, ако пропуснете доза, вземете следващата, както Ви е предписана. Не взимайте двойна доза по едно и също време, за да наваксате пропуснатата.

Ако вземете повече CRESTOR, отколкото трябва:


Ако вземете повече от Вашата нормална доза, свържете се незабавно с лекар или с най-близката болница.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както при всички лекарства, CRESTOR може да има нежелани реакции. Те обикновено са леки и изчезват за кратко време.

Най-често срещаните нежелани реакции са главоболие, болки в мускулите, болки в стомаха, чувство на слабост, констипация (запек), замаяност и неразположение. По-рядко е възможно да се наблюдават кожно-алергични реакции, сърбеж и поява на уртикария (копривна треска). Рядко се наблюдава и поява на жълтеница, хепатит или изтръпвания. Много рядко е наблюдавана поява на алергични реакции. Незабавно прекратете лечението с CRESTOR и потърсете медицинска помощ в случай, че забележите появата на някой от следните симптоми (алергични прояви):

- При поява на задух с или без оток по лицето, устните, езика и/или гърлото.
- При поява на оток по лицето, устните, езика и/или гърлото, затрудняващ гълтането.
- При поява на силен сърбеж и обрив по кожата.



При малък брой пациенти са наблюдавани нежелани мускулни ефекти, така че като предпазна мярка, ако имате болки в мускулите, за които не знаете причината или продължат по-дълго отколкото очаквате, трябва да кажете на Вашия лекар възможно най-бързо. Вашият лекар може да Ви направи кръвен тест да провери състоянието на Вашите мускули.

Не се безпокойте от този списък на възможни нежелани реакции. Вие може да нямате нито една от тях.

Уведомете лекуващия си лекар или фармацевта, ако мислите, че имате някои от тези или други проблеми докато вземате Вашите таблетки CRESTOR..

5. СЪХРАНЕНИЕ НА CRESTOR

- Като всички лекарства, **СЪХРАНЯВАЙТЕ ТАБЛЕТКИТЕ НА ЗАЩИТЕНО МЯСТО**, където децата не могат да ги видят или да ги стигнат. Вашите таблетки може да им навредят.
- Да се съхранява при температура под 30°C.
- Съхранявайте таблетките в оригиналната им опаковка.
- Ако лекуващият Ви лекар Ви каже да спрете приема на таблетки върнете всички останали на фармацевта.
- Не употребявайте таблетките след датата на изтичане на срока на годност, обозначена върху опаковката. Върнете всички таблетки с изтекъл срок на годност на фармацевта.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Дата на изготвяне: 15 февруари 2005 г.

CRESTOR е търговска марка собственост на AstraZeneca group of companies

©AstraZeneca 2006

