



М. Платиканова
М. Платиканова
21.02.02



ASPIREX[®]
АСПИРЕКС
ACETYSALICYLIC ACID - 325 mg

0001 01/2002

325 mg
100 Tablets

Производител: **A&S Pharmaceutical Corp. U.S.A.**
Притежател на разрешението за употреба
BORA, 1001 Со.,
София 1124, ул. Мизия 19

АСПИРЕКС

АКТИВНА СЪСТАВКА: Acetylsalicylic acid 325 mg.
НЕАКТИВНА СЪСТАВКА: Нишасте 38 mg.
ПОКАЗАНИИ: За временно лечение на слаби до средно силно изразени болки в мускулите, артрит, при менструация, зъболбол, главоболие, повишена температура при простуда и грип.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРАНЕ: Възрастни и деца над 12 години: 1-2 табл. разтворени във вода на всеки 4-6 часа; максимално до 12 табл. дневно. Деца от 6 до 12 год. - по 1/2 таблетка, до 3 пъти дневно. Таблетките се приемат след разтваряне в топла вода.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се препоръчва приемането на АСПИРЕКС от деца под 12 год., особено при вирусни заболявания поради опасност от синдром на Рей. Приемането на АСПИРЕКС от деца под 12 год., се извършва само след предписания от лекар. Като болкоуспокояващо, АСПИРЕКС не бива да се приема повече от 10 дни, а като температуропонижаващо - повече от 3 дни, освен по лекарско указание. Ако симптомите продължават или се появяват нови незабавно се консултирайте с лекар. При шум в ушите и/или отслабване на слуха, спрете приема на АСПИРЕКС и се консултирайте с лекар. При предозиране потърсете незабавно лекарска помощ. При бременност и кърмене преди да приемате АСПИРЕКС се консултирайте с лекар.
ПРОТИВОПОКАЗАНИИ: АСПИРЕКС не да се приема при алергия към аспирин или други НСПВ, астма, проблеми със стомаха, освен ако не е изрично предписан от лекар. АСПИРЕКС е противопоказан през третото тримесечие на бременността, освен ако не е изрично предписан от лекар. При ежедневна употреба на алкохол, е необходимо да се консултирате с лекар преди да приемате АСПИРЕКС, поради опасност от кървене.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: АСПИРЕКС не бива да се приема едновременно с лекарствата за лечение на диабет, подагра, артрит, антикоагуланти, кортикостероиди, метотрексат, спиронолактон поради опасност от нежелани реакции, освен ако не е изрично предписан от лекар.
НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ: Реакции на сърбчивост и отпадане на отстрана на стомашно-чревния тракт. При продължителна употреба на високи дози съществува риск от кървене на стомашно-чревния тракт.
НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява при стабилна температура на достъпно за деца място.
ОПАКОВКА: Таблетки по 325 mg., по 100 бр. в опаковка.

Per. No