

Преди употреба внимателно прочетете написаното в листовката

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА
Aspitin tabl. 300 mg

Аспитин табл. 300 мг

o СЪСТАВ

Всяка таблетка аспитин съдържа като активна съставка 300 мг ацетилсалицилова киселина.

o ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Таблетки

o ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА АСПИТИН?

Аспитин притежава кардиопротективен ефект. Аспитин се използва при лечение и профилактика на миокарден инфаркт и нестабилна ангина, профилактика на артериална тромбоемболия, профилактика на исхемичен инсулт, лечение на перикардити, коронарен байпас и ангиопластика, повишена телесна температура, костно-ставни и мускулни болки, главоболие, миалгия.

ВНИМАНИЕ!

o КОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМА АСПИТИН?

Аспитин не бива да се приема при свръхчувствителност към ацетилсалицилова киселина или друго нестероидно противовъзпалително средство.

o СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако отговорите с ДА на някой от следните въпроси или не сте сигурен, се посъветвайте с вашия лекар преди да приемате АСПИТИН:

- Имали ли сте алергична реакция (астма, кашлица, трудност при дишане) след приемане на ацетилсалицилова киселина?
- Имали ли сте проблем със съсирването на кръвта?
- Имали ли сте язва на стомаха или тънките черва?
- Имате ли проблеми с бъбреците или черния дроб?
- Диабетик ли сте?
- Приемате ли други лекарства, като антикоагуланти, фенитоин, натриев валпроат, пробенецид, сулфонамиди?
- Не приемайте антиацидни лекарствени средства непосредствено преди или след приема на аспитин!
- Бременна ли сте? Не приемайте аспитин през последните три месеца от бременността, тъй като това може да усложни раждането.
- Кърмите ли? Не приемайте аспитин ако кърмите, тъй като той се отделя в малки количества в майчиното мляко.

Не се препоръчва даването на аспитин на деца под 12 години с повишена температура (следствие на вирусни заболявания – грип, шарка) поради опасност от синдрома на Рей (рядко срещано заболяване, което обхваща мозъка и черния дроб).

Не се препоръчва приемането на аспитин във високи дози и за продължително време.

o ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Винаги информирайте вашият лекар или фармацевт когато приемате и други лекарства. Аспитин може да взаимодейства с алкохол, противовъзпалителни средства, антикоагуланти, хормони, антидиабетични средства, антиепилептични средства, пробенецид, гинко билоба.

◉ **БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ**

По време на бременност и кърмене винаги се съветвайте с вашият лекар или фармацевт преди да приемате лекарствен продукт.

Не се препоръчва приемането на аспитин по време на бременност, освен ако не е изрично предписан от лекар.

◉ **КАК ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМА АСПИТИН?**

Следвайте инструкциите на вашия лекар. Таблетките се приемат с чаша вода.

Ако аспитин дразни стомаха ви, приемайте го по време на хранене.

Ако вашият лекар не е предписал друго, то препоръчаната доза е 1 таблетка дневно, а при остри перикардити след миокарден инфаркт – 1 таблетка 2 пъти дневно.

◉ **НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ**

- диария
- гадене, повръщане
- парене в стомаха
- намалено количество на урината

Ако забележите трудност в дишането или кашлица, шум в ушите, обрив, черни изпращания, обърканост, замаяност, стомашна болка – СПРЕТЕ ВЕДНАГА ДА ПРИЕМАТЕ АСПИТИН И СЪОБЩЕТЕ НА ВАШИЯ ЛЕКАР ЗА СЪСТОЯНИЕТО СИ.

ИНФОРМИРАЙТЕ ВАШИЯТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА ВСЕКИ НЕЖЕЛАН ИЛИ НЕПРИЯТЕН ЕФЕКТ, КОЙТО СТЕ ЗАБЕЛЕЖАЛИ И НЕ Е ОТБЕЛЯЗАН В ТАЗИ ЛИСТОВКА.

◉ **СЪХРАНЕНИЕ**

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕПАРАТА СЛЕД ДАТАТА ПОСОЧЕНА НА ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Срок на годност 4 години.

◉ **СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ**

Да се съхранява при температура 25° С на сухо и недостъпно за деца място.

◉ **ПРОИЗВОДИТЕЛ**

Фирма "Intersebelo Holding Ltd" – Клон Русе

Ул. Александровска 80

7002 гр. Русе

тел/факс: 082 844 217

В ТАЗИ ЛИСТОВКА НЕ Е ДАДЕНА ПЪЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОВА ЛЕКАРСТВО. АКО СЛЕД ПРОЧИТАНЕТО И ВЪЗНИКНАТ НЯКАКВИ ВЪПРОСИ, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ВАШИЯ ЛЕКАР.

Запомнете! Това лекарство е предписано за вас! Никога не го отстъпвайте на друг, дори и да има същите симптоми като вас. Това може да му навреди!

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА ПОПРАВКА НА ТЕКСТА: Януари 2001 г.