



Прочетете листовката внимателно, преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.


Запазете листовката. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате каквито и да било въпроси, моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Този лекарствен продукт е предписан на вас лично и Вие не трябва да го давате на други.

Той може да им навреди, дори и когато техните симптоми са като Вашите.

Kamiren® tablets 1 mg
Kamiren® tablets 2 mg
Kamiren® tablets 4 mg
Камирен таблетки 1 mg
Камирен таблетки 2 mg
Камирен таблетки 4 mg



Doxazosin/Доксазозин

Активно вещество: doxazosin.

Помощни вещества: микрокристална целулоза, натрий карбоксиметилово нишесте, магнезиев стеарат, натриев лаурил сулфат, лактоза монохидрат.

Име и адрес на производителя и притежателя на разрешението за употреба
Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

1. КАКВО Е КАМИРЕН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Състав

1 таблетка съдържа 1 mg doxazosin като doxazosin mesylate.

1 таблетка съдържа 2 mg doxazosin като doxazosin mesylate

1 таблетка съдържа 4 mg doxazosin като doxazosin mesylate

Опаковка

Блистерна опаковка 20 таблетки от 1 mg (2 блистера по 10 таблетки), картонена кутия.

Блистерна опаковка 30 таблетки от 1 mg (3 блистера по 10 таблетки), картонена кутия.

Блистерна опаковка 20 таблетки от 2 mg (2 блистера по 10 таблетки), картонена кутия.

Блистерна опаковка 30 таблетки от 2 mg (3 блистера по 10 таблетки), картонена кутия.


Блистерна опаковка 20 таблетки от 4 mg (2 блистера по 10 таблетки), картонена кутия.

Блистерна опаковка 30 таблетки от 4 mg (3 блистера по 10 таблетки), картонена кутия.

Какво е Камирен?

Камирен съдържа doxazosin, вещество, което потиска α -адренергичните рецептори. Това са специални структури в някои гладкомускулни клетки, които регулират техните контракции.

Камирен отпуска мускулите в стените на кръвоносните съдове. Това разширява кръвоносните съдове и понижава повишеното кръвно налягане. Той понижава и нивата на мастите в кръвта (холестерол и триглицериди), като по този начин има допълнителен благоприятен ефект върху сърцето и кръвоносните съдове. Действието му продължава през целия ден, като максимален ефект при понижаване на кръвното налягане се достига 2 до 6 часа след приемането на лекарствения продукт. По препоръка на Вашия лекар, Вие може да приемате Камирен едновременно с други лекарствени продукти, понижаващи кръвното налягане.





Камірен предотвратява контракциите на гладката мускулатура в горната част на уретрата и на мускулите на простатата, които притискат уретрата. Това отпускане на мускулатурата подобрява микцията и значително облекчава симптомите, наблюдавани при доброкачествена хиперплазия на простатата. Ефектът на доказозин върху нормалното кръвно налягане е незначителен.

За какво се използва Камірен?

Камірен се препоръчва за лечение на леко до умерено повишено кръвно налягане (хипертония).

Камірен се препоръчва за намаляване на симптомите, свързани с разрастването (хиперплазия) на простатата

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ КАМИРЕН

Информирайте Вашия лекар, ако страдате от някакво хронично заболяване, метаболитно нарушение, ако сте свръхчувствителен или приемате и други лекарствени продукти.

Кой не трябва да приема Камірен?

Вие не трябва да приемате този лекарствен продукт, ако сте свръхчувствителен към doxazosin, други квиназолинови производни (prazosin, terazosin), или към някое от помощните вещества в този лекарствен продукт.

Предпазни мерки и предупреждения

След първата доза doxazosin, Вашето кръвно налягане може да се понижи значително. Възможно е да настъпи замаяване, световъртеж, а също и прималяване. С оглед това да се предотврати, започнете лечението с 1 mg от лекарствения продукт вечер преди лягане. Бъдете внимателни при изправяне, и по-специално, ако сте възрастен пациент или приемате едновременно други лекарствени продукти, които понижават кръвното налягане и/или диуретици.

Ако приемате Камірен заради уголемена простата, Вие трябва да се прегледате при уролог преди началото на лечението.

Ако имате чернодробно нарушение, приемайте лекарствения продукт много внимателно, тъй като неговия метаболизъм е забавен.

Камірен не се препоръчва при деца, тъй като сигурността и ефективността от лечението при тях не са доказани.

Приемане на Камірен с храни и напитки

Лекарственият продукт може да се приема преди, по време или след хранене.

Бременност

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да приемате какъвто и да било лекарствен продукт.

Вие можете да приемате Камірен по време на бременност, само ако потенциалната полза за майката, превишава риска за плода.

Кърмене

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да приемате какъвто и да било лекарствен продукт.

Кърмене по време на лечение с doxazosin не се препоръчва.





Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

В началото на лечението с Камиген и при промяна на дозировката, кръвното налягане може да се понижи значително. Може да се появи световъртеж, затова в такива случаи не се препоръчва шофиране и работа с машини.

Как другите лекарствени продукти могат да взаимодействат с Камиген?

Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или сте приемали наскоро някакви други лекарствени средства, дори и такива без рецепта.

Ако приемате и други лекарствени продукти, които понижават кръвното налягане едновременно, кръвното ви налягане може да се понижи значително, затова се изисква внимание в началото на лечението. Вие трябва да бъдете внимателен и ако приемате едновременно лекарствени продукти, които засилват или забавят чернодробния метаболизъм, тъй като ефекта на Камиген върху кръвното налягане може да се засили или понижи.

3. КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КАМИРЕН

Дозировка и начин на приложение

Стриктно следвайте лекарските инструкции. Вие не трябва да променяте дозировката или да прекратите лечението без първоначално да се консултирате с Вашия лекар.

Приемайки редовно лекарствения продукт, вие ще намалите честотата и тежестта на нежеланите реакции и ще улесните лекаря в определянето на най-благоприятната доза.

Повишено кръвно налягане (хипертония): Започнете лечението с 1 таблетка от 1 mg еднократно дневно. Трябва да приемете първата доза вечер, преди лягане. Взимайки предвид ефекта, лекарят постепенно ще повиши дозировката. Максималната дневна дозировка е 4 таблетки от 4 mg (16 mg).

Доброкачествено разрастване (хиперплазия) на простатата: Ако имате нормално кръвно налягане, започнете лечението с 1 таблетка от 1 mg дневно. Трябва да приемете първата доза вечер, преди лягане. Взимайки предвид ефекта, лекарят постепенно ще повиши дозировката. Максималната дневна дозировка е 2 таблетки от 4 mg (8 mg).

Ако имате чернодробно увреждане се изисква намаляване дозите на Камиген.

Ако имате впечатление, че ефекта от лекарствения продукт е твърде силен или твърде слаб, трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече Камиген отколкото би трябвало

Ако сте приели свръхдоза, трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт незабавно.

Твърде високите дози основно предизвикват понижаване на кръвното налягане, замаяване, световъртеж, а също е възможна прималяване. Ако почувствате някои от тези симптоми, легнете, като главата трябва да е по-ниско, а краката да са леко повдигнати. Консултирайте се с Вашия лекар относно по-нататъшната употреба на този лекарствен продукт. Може би се нуждаете от намаляване на дозата или преустановяване на лечението за известно време.

Ако сте приели голям брой таблетки, обадете се на Вашия лекар незабавно. Не предизвиквайте повръщане, а легнете по начина който е описан по-горе.

Ако забравите да приемете Камиген

Не взимайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.





Ако забравите да вземете определената доза, трябва да направите това колкото е възможно по-скоро. Ако вече е станало време за следващата доза, оставете пропуснатата и продължете с обичайната доза в определеното време.

Риск от прекратяване на лечението с Kamiren

Трябва да приемате редовно Kamiren. Ако не сте приемали лекарствения продукт няколко дни, трябва да започнете лечението отново с най-ниската доза.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарствени продукти, Kamiren също може да предизвика нежелани лекарствени реакции.

Когато започвате лечението или при повишаване на дозировката, кръвното налягане може да се понижи при изправяне от легнало или седнало положение и това да предизвика замаяване и световъртеж и дори прималяване. Тези реакции обикновено изчезват спонтанно, но ако продължат по-дълго време или са тежки, трябва да се консултирате с Вашия лекар незабавно (виж също "Ако сте приели повече Kamiren отколкото би трябвало"). Може да се наблюдават отпадналост и сънливост, главоболие, слабост на мускулатурата, оток на глезените и подбедриците, гадене и запушване на носа, засилване или забавяне на сърцебиенето и задръжка на урина.

Ако забележите каквито и да било нежелани реакции, дори и такива, които не са споменати в тази листовка, моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА KAMIREN

Срок на годност

Да не се използва след срока на годност, посочен на опаковката.

Условия за съхранение

Да се съхранява под 30°C.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Информация за предписване

Само по лекарско предписание.

Дата на последна корекция

5 декември 2003

