

## 1. ПРОЕКТ ЗА ЕТИКЕТ НА ПЪРВИЧНА ОПАКОВКА

# Листа от СЕНА билков чай

Sennae Folium  
herbal tea

30 g / 500g / 1000g

Рез. № xxxxxxxx

**ТАЛОДЕРМА**  
ФАРМАЦЕВТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ

**СЪСТАВ:** 30g/500g/1000g Листа от Сена (Sennae Folium) съдържа: Sennae Folium 30g/500g/1000g

**Показания:** Прилага се, като меко слабително средство при запек. Подходящо за деца над 10 години, за пациенти със заболявания, при които се налага леко освобождаване на дебелото черво (хемороиди, преди и след операции в коремната кухина, на дебелото черво, преди рентгеноскопии и др.).

**Дозировка и начин на употреба:** Начин на приготвяне:

1. Запарка - една чаена лъжичка листа от сена се заливат с 250 ml вряла вода. След изстиване запарката се прецежда.

2. Студен извлек - една чаена лъжичка листа от сена се заливат с 250 ml студена вода, като се разбърква. След около 12 часа извлекът се прецежда.

Пие се вечер преди лягане.

**Дозировка:** От 10 до 18 години - по 100 ml; Над 18 години - по 200 ml.

Слабителното действие настъпва след около 6 - 8 часа. Трайността на извлека е 12 часа, при температура 28 С. Да не се употребява повече от 2 /две/ седмици без консултация с лекар.

**Противопоказания:** Да не се прилага при свръхчувствителност към сена, перитонит, апендицит, язвен ентероколит, стеаноза, атония, възпаления на дебелото черво, болки в корема, тежка дехидратация, чревна непроходимост, спастичен колит, спастичен и хроничен запек. Да не се употребява от деца под 10-годишна възраст.


**Специални предупреждения за употреба:** Да се избягва продължителната употреба, тъй като червата изгубват нормалната си перисталтика. Да не се прилага при остра и персистираща коремна симптоматика. Ако от 6 до 12 часа след приемане на извлек не настъпи очистителния ефект, лечението се прекратява. Злоупотребата с продукта, която се характеризира с диария и последваща загуба на вода и електролити може да бъде причина за: зависимост, характеризираща се с възможна необходимост за увеличаване на дозата; нарушен водно-електролитен баланс; атоничен колон с нарушена функция. Лечението да се провежда с прием на значителни количества течности и храни богати на калий. Употреба на стимулиращи лаксативи за повече от 2 седмици изисква лекарско наблюдение.

**Бременност и кърмене:** Да се избягва през първия триместър на бременността или да се приема само под лекарско наблюдение. Не се препоръчва употребата по време на кърмене.

**Нежелани лекарствени реакции.** Възможни са колики, крампни, промени в електролитния баланс, общата слабост и нарушено равновесие промяна в цвета на урината, в жълто или червено-кафяво. Хроничната употреба може да доведе до псевдомеланозис коли безопасно състояние, което отминава след преустановяване на лечението.

**Срок на годност:** 3 /три/ години.

**Специални условия на съхранение:** В сухи, защитени от светлина помещения, при температура под 25 С. Да се съхранява на място недостъпно за деца! Да не се използва след изтичане срока на годност посочен върху опаковката!




"ТАЛОДЕРМА" ООД, Варна, 9000, П. К. 98,  
тел.: 052 502073, 052 502078, факс 052 502076,  
e-mail: office@thaloderma.com

Апр. № 136100



Парт. №  
Годен до



24.02.2006г  
Варна

21.03.06  
ЕМ

Управител  
/Ст. Пенев/

20.03.2006