

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 17-07-06г.

Моля, прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Тази листовка ще Ви даде информация за НАКСОЖИН.
- Ако имате допълнителни въпроси, моля попитайте Вашия лекар или Вашия фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас и не трябва да го давате на други хора. То може да им навреди дори, когато техните оплаквания са същите като Вашите.
- Запазете тази листовка, може да пожелаете да я прочетете отново.

В тази листовка:

1. Какво представлява НАКСОЖИН и за какво се използва
2. Преди да започнете да приемате НАКСОЖИН
3. Как трябва да се приема НАКСОЖИН
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхраняване на НАКСОЖИН
6. Допълнителна информация

NAXOGIN® 500 mg таблетки
НАКСОЖИН 500 мг таблетки
Nimorazole

Името на това лекарство е НАКСОЖИН. Лекарственото вещество е nimorazole (ниморазол). Всяка таблетка съдържа 500 мг от лекарственото вещество.

Помощните вещества са: микрочистална целулоза, царевично нишесте, метилцелулоза 400, стеаринова киселина.

Притежател на разрешението за употреба:

PFIZER EUROPE MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, England CT13 9NJ

Производител:

Pharmacia Italia S.p.A.
Via del Commercio-Zona Industriale
64046 Marino del tronto
Ascoli Piceno
Italy

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НАКСОЖИН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

НАКСОЖИН се предлага под формата на таблетки, съдържащи 500 мг лекарствено вещество.

НАКСОЖИН се предлага в опаковка, съдържаща 6 броя таблетки.

Какъв тип лекарство е НАКСОЖИН

НАКСОЖИН принадлежи към група лекарства, наречени трихомонациди (антибактериални лекарства).

За какво се използва НАКСОЖИН



НАКСОЖИН се използва за лечение на:

Трихомониаза (инфекция на пикочно-половите органи, причинена от *Trichomonas vaginalis*)

Амебиаза (амебна дизентерия)

Ламблиаза (заболяване, възникващо вследствие на поражение на тънките черва, черния дроб и жлъчния мехур, причинено от чревния паразит *Lambliia intestinalis*).

2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ НАКСОЖИН

НАКСОЖИН не трябва да се използва:

Ако сте получавали алергична реакция към ниморазол или други антибактериални средства, наречени нитроимидазоли, или някое от помощните вещества в състава на лекарството, описани по-горе. Ако страдате от тежко чернодробно заболяване, тежки нарушения на хемопоезата (кръвотворенето) или заболяване на централната нервната система (напр.случаи на припадъци).

Ако отговорът на някои от въпросите по-долу е ДА, уведомете Вашия лекар преди да приемете НАКСОЖИН, тъй като това лекарство може да не е подходящо за Вас.

- Приемате ли антикоагуланти (противосъсирващи) лекарства?
- Бременна ли сте? Кърмите ли?
- Консумирате ли алкохол?

Съобщете незабавно на Вашия лекар, ако получите кожен обрив, отоци по лицето и тялото, свиркащо дишане или хрипове по време на лечението с НАКСОЖИН.

При продължителна употреба на високи дози НАКСОЖИН Вашият лекар може да Ви назначи изследвания на кръвта.

Бременност

НАКСОЖИН не трябва да се приема по време на бременност, освен ако Вашият лекар не Ви е препоръчал друго. Жени в детородна възраст е необходимо да използват ефикасни противозачатъчни средства. Свържете се незабавно с Вашия лекар, ако забременеете, смятате, че сте забременели или планирате забременяване, докато приемате НАКСОЖИН.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да вземате каквото и да е лекарство, ако сте бременна.

Кърмене

Докато употребявате НАКСОЖИН, не се препоръчва да кърмите, тъй като не е известно дали НАКСОЖИН се излъчва в майчиното мляко. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да вземате каквото и да е лекарство, докато кърмите.

Шофиране и работа с машини:

Клиничният опит показва, че е малко вероятно НАКСОЖИН да наруши способността Ви за шофиране и работа с машини.

Прием на други лекарства:

Преди да започнете да приемате каквото и да е ново лекарство с НАКСОЖИН трябва да говорите с Вашия лекар. Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако в момента вземате или наскоро сте вземали каквото и да е друго лекарство, даже и без лекарско предписание.

НАКСОЖИН и някои други лекарства могат да си влияят едно на друго (взаимодействие). НАКСОЖИН не трябва да се приема едновременно с някои антикоагулантни лекарства (warfarin).



Прием на НАКСОЖИН с храна и напитки:

Не се препоръчва консумация на алкохол, докато приемате НАКСОЖИН.

При едновременен прием на НАКСОЖИН и алкохол е възможна появата на специфична реакция с прояви на замайване и повръщане.

3. КАК ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМА НАКСОЖИН

Винаги приемайте НАКСОЖИН точно както вашият лекар Ви е инструктирал. Ако не сте сигурни, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Вашият лекар ще определи каква доза е подходяща за Вас.

За лечение на трихомониаза се препоръчва единична перорална доза от 2 г ниморазол. Силно се препоръчва едновременно лечение на партньора със същата доза, за да се избегне повторна инфекция.

За лечение на амебиаза или на ламблиаза се препоръчва 1 г 2 пъти дневно в продължение на 5-7 дни.

Дозировката при деца е 20-30 мг/кг. телесно тегло.

Продължителността на лечението (освен лечението на трихомониазна инфекция с еднократна доза) е 5 – 7 дни.

Освен ако вашия лекар не е препоръчал друго, не се препоръчва продължителност на лечението над 10 дни.

Най-добре е да приемате таблетката НАКСОЖИН цяла, с малко течност след хранене.

Вашият лекар може да Ви предпише различна схема на дозиране и/или доза, ако имате увреждане на черния дроб.

Ако приемете по-голямо от необходимото количество НАКСОЖИН:

Обадете се незабавно на Вашия лекар или отидете до най-близкото болнично спешно отделение. Вземете опаковката от НАКСОЖИН с Вас, дори ако в нея не са останали таблетки.

Ако забравите да вземете НАКСОЖИН:

Важно е да вземате вашите таблетки НАКСОЖИН редовно по едно и също време всеки ден. Ако забравите да вземете една доза, вземете я веднага щом си спомните, освен ако не е дошло време за Вашата следваща доза. В този случай просто продължете със следващата доза по обичайния начин. Не вземайте 2 дози по едно и също време, за да наваксате дозата, която сте пропуснали.

Ефекти при спиране на лечението с НАКСОЖИН:

Не спирайте да приемате НАКСОЖИН освен ако Вашият лекар не Ви е казал да направите това.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

НАКСОЖИН, както всички лекарства, може да причини някои нежелани лекарствени реакции. От досега наблюдаваните нежелани лекарствени реакции при лекарства от така наречената 5 – нитроимидазолова група, към която принадлежи и НАКСОЖИН, най-чести са



стомашно-чревни оплаквания като горчив вкус, гадене, повдигане, повръщане, тежест в стомаха, диария, главоболие.

Ако някоя от тези нежелани реакции се окаже трайна или обезпокоителна или ако забележите нежелана реакция, която не е спомената в тази листовка, моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЯВАНЕ НА НАКСОЖИН

Съхранявайте Вашето лекарство при температура под 25°C.

Пазете всички лекарства място, недостъпно за деца!

Съхранявайте в оригиналната опаковка.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не употребявайте след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията в тази листовка се отнася само за НАКСОЖИН. Тази листовка не съдържа цялата информация за това лекарство. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последна редакция на листовката:

