

B₁₂ >>Ankermann<<[®] 100 µg , B₁₂ >>Ankermann<<[®] 1000 µg

Информация за употреба

Уважаеми пациенти !

Моля прочетете следващата информация за употреба внимателно, защото тя съдържа важни данни за това, което Вие трябва спазвате при употребата на лекарственото средство. Ако имате въпроси, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

B 12 >> Ankermann<<[®] 100 µg

B 12 >> Анкерман<<[®] 100 µg

B 12 >> Ankermann<<[®] 1000 µg

B 12 >> Анкерман<<[®] 1000 µg

инжекционен разтвор

Активно вещество: Суанособаламин

Състав:

Активно действащи съставки:

1 ампула инжекционен разтвор съдържа:

B 12 >>ANKERMANN<<[®] 100 µg: 100 µg Суанособаламин

B 12 >>ANKERMANN<<[®] 1000 µg: 1000 µg Суанособаламин

Указание: Цианокобаламинът принадлежи към група от вещества, които се обозначават общо като „Витамин В₁₂“.

Други активни съставки: 20 мг бензилов алкохол/мл

Други съставки: натриев хлорид, оцетна киселина, вода за инжекции

Лекарствена форма и съдържание на опаковката:

B 12 >>ANKERMANN<<[®] 100 µg: Оригинална опаковка: 1 инжекционен флакон от 5 мл

B 12 >>ANKERMANN<<[®] 1000 µg: Оригинална опаковка: 1 инжекционен флакон от 5 мл
5 ампули от 1 мл
10 ампули от 1 мл

Витаминен препарат

рег. №: 940 0969/940 0970

Притежател на регистрацията:

Wölgag Pharma GmbH & Co.KG

Calwer Strasse 7

71034 Böblingen

тел: 0049/7031/620 4-0

факс: 0049/7031/620 4-31

Производител:

Solpharm Pharmaceutische Erzeugnisse GmbH & Co, Bahnhofstr. 17, 34212 Melsungen, Germany

$B_{12} \gg \text{Ankermann} \ll^{\circledR} 100 \mu\text{g}$, $B_{12} \gg \text{Ankermann} \ll^{\circledR} 1000 \mu\text{g}$

Области на приложение:

Пернициозна и други макроцитни анемии (нарушение в узряването на червените кръвни клетки), неврологични и дерматологични заболявания (заболявания на нервната система и кожата), както и фуникуларна спинална болест (увреждане на гръбначния мозък), които се дължат на витамин B_{12} -дефицит. След резекции и при смущения в стомашно-чревния тракт, като допълнително средство при полиартрити (възпаления на ставите), доколкото е налице дефицит на витамин B_{12} . Симптоми на такъв дефицит могат да бъдат: бледност, умора, мравучкане в ръцете и краката, несигурност в походката и понижена физическа издръжливост.

Противопоказания

Кога не трябва да се прилага $B_{12} \gg \text{Ankermann} \ll^{\circledR} 100 \mu\text{g} / 1000 \mu\text{g}$?

$B_{12} \gg \text{Ankermann} \ll^{\circledR} 100 \mu\text{g} / 1000 \mu\text{g}$ съдържа бензилов алкохол и поради възможността за поява на керн иктер не трябва да се прилага при новородени, особено при незрели преждевременно родени и при деца на възраст под 3 години..

Какво трябва да се съблюдава по време на бременност и кърмене ?

Препоръчаната дневна доза от витамин B_{12} по време на бременността и кърменето възлиза на 4 μg . Според досегашните познания, при прилагане на по-големи количества няма вредни действия върху нероденото дете. Витамин B_{12} се отделя в майчиното мляко.

Взаимодействия с други средства

Кои други лекарствени средства повлияват действието на $B_{12} \gg \text{Ankermann} \ll^{\circledR} 100 \mu\text{g} / 1000 \mu\text{g}$?

До сега не са известни никакви взаимодействия.

Какви химически непоносимости (несъвместимости) могат да се появят ?

Въз основа на нестабилността на витамин B_{12} , чрез смесване с други лекарства може да се понижи активността на витамина.

Упътване за дозировка, начин и продължителност на приложение:

Следващите указания важат, само в случай ,че Вашият лекар не Ви е предписал $B_{12} \gg \text{Ankermann} \ll^{\circledR} 100 \mu\text{g} / 1000 \mu\text{g}$ по друг начин.

Колко от $B_{12} \gg \text{Ankermann} \ll^{\circledR} 100 \mu\text{g} / 1000 \mu\text{g}$ да се прилага?

Колко често се прилага $B_{12} \gg \text{Ankermann} \ll^{\circledR} 100 \mu\text{g} / 1000 \mu\text{g}$?

В хематологията се прилагат 100 μg на инжекция 1-2 пъти седмично, при необходимост дори по-често до нормализиране на кръвната картина. Поддържащата доза е 100 μg на всеки 2-4 седмици.

За начало на лечението, през първите две седмици след поставяне на диагнозата, се прилага 1 мл (1 ампула).

$B_{12} \gg \text{Ankermann} \ll^{\circledR} 1000 \mu\text{g}$ се прилага 1 до 2 пъти седмично, съответно 1000 до 2000 μg цианкобаламин за седмица.

При остри и хронични неврологични заболявания и в дерматологията може да се прилагат без риск по-високи дози витамин B_{12} през по-продължителен интервал от време.

Следва орално лечение с B_{12} ANKERMANN[®] -капки.

Как и кога се прилага $B_{12} \gg \text{Ankermann} \ll^{\circledR} 100 \mu\text{g} / 1000 \mu\text{g}$?

B_{12} >> Ankermann <<® 100 µg , B_{12} >> Ankermann <<® 1000 µg

B_{12} >> Ankermann <<® 100 µg / 1000 µg по правило се прилага вътремускулно (инжектира се в мускула). Може обаче да се инжектира и бавно интравенозно или подкожно (инжектиран във вена или под кожата).

Колко дълго се прилага B_{12} >> Ankermann <<® 100 µg / 1000 µg ?

B_{12} >> Ankermann <<® 100 µg / 1000 µg е предназначен за по-продължително приложение. За това, моля попитайте Вашия лекар.

Предозиране и други грешки при употреба

Какво следва да се направи, ако B_{12} >> Ankermann <<® 100 µg / 1000 µg е приет в твърде големи количества (преднамерено или непредпазливо предозиране)?

Отравяния или явления на предозиране не са известни.

На какво трябва да обърнете внимание, ако прекъснете или преждевременно прекратите лечението ?

При прекъсване на лечението Вие застрашавате лечебния успех! Ако при Вас са проявени неприятни странични действия, моля говорете с Вашия лекар относно продължаването на лечението.

Нежелани лекарствени реакции:

Какви странични действия могат да настъпят при употребата на B_{12} >> Ankermann <<® 100 µg / 1000 µg ?

В отделни случаи са наблюдавани кожни прояви (акне, екземни и уртикарни медикаментозни реакции), ангиоедеми и прояви на свръхчувствителност (анафилактични, респ. анафилактоидни реакции).

Ако наблюдавате върху себе си странични действия, които не са отразени в тази листовка, моля споделете ги с Вашия лекар или фармацевт.

Указания и упътвания за срока на годност на лекарството

- Датата, указваща срока на годност е отпечатана върху опаковката. Не употребявайте лекарството след тази дата !
- Ампулите са предназначени за еднократна употреба.

Как трябва да се съхранява B_{12} >> Ankermann <<® 100 µg / 1000 µg ?

- Лекарството да не се излага на директна слънчева светлина и температурни колебания !
- Моля, съхранявайте това лекарство грижливо и на недостъпни за деца места.

Актуалност на информацията: 07/00

За информация на нашите пациенти

Вашият лекар Вие предписал B_{12} >> Ankermann <<® 100 µg , респ. 1000 µg .
Витамин B_{12} -препаратите са с различна дозировка.

Витамин B_{12} е изключително необходим за обмяната в клетката, за нормалното кръвообразуване и за функционирането на нервната система. Той регулира продукцията на нуклеинови киселини и чрез това, изграждането на нови клетъчни ядра.

B_{12} >>Ankermann<<® 100 µg , B_{12} >>Ankermann<<® 1000 µg

Дефицит на B_{12} може да възникне поради недостатъчният му прием с храната (напр. при вегетариански начин на хранене, хранене с полуготови храни), при смущения в усвояването на храната и чревни заболявания.

Дефицит на B_{12} може да се изяви чрез нехарактерни симптоми, като: отпадналост, бледност, мравучкане по ръцете и краката, несигурност в походката и понижена физическа издръжливост.