

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ИАЛ
ОДОБРЕН
ДАТА 06.06.06

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да вземате този лекарствен продукт.

- Пазете тази листовка. Може да се наложи да я четете отново.
- Ако имате допълнителни въпроси, моля, задайте ги на Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарствено средство е предписано лично на Вас и Вие не трябва да го преотстъпвате на други хора. То може да им навреди, даже и ако техните оплаквания са същите като Вашите.

Съдържание на листовката:

1. Какво представлява ПРЕСТАРИУМ 10 mg и за какво се използва?
2. Преди да започнете да вземате ПРЕСТАРИУМ 10 mg
3. Как се взема ПРЕСТАРИУМ 10 mg?
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Съхранение на ПРЕСТАРИУМ 10 mg

ПРЕСТАРИУМ 10 mg, таблетки

Perindopril arginine

- Активното вещество е периндоприл аргинин. Всяка таблетка съдържа 5 mg периндоприл аргинин.
- Помошните вещества са лактозаmonoхидрат, хидрофобен колоидален силициев двуокис, магнезиев стеарат, малтодекстрин, натриев скорбелен гликолат (тип A), макрогол 6000, глицерол (E422a), хипромелоза (E464), медни съединения от хлорофилен (E141 ii) лак и титанов диоксид (E171).

Притежател на разрешението за употреба:



Les Laboratoires Servier
22 rue Garnier
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

Производители:

Les Laboratoires Servier Industrie
905 route de Saran
45520 Gidy
FRANCE

Servier Industries Limited
Gorey Road
Arklow, Co. Wicklow
IRELAND

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕСТАРИУМ 10 mg И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

ПРЕСТАРИУМ 10 mg се предлага в картонени кутии, съдържащи зелени, кръгли, двойно изпъкнали филмирани таблетки, гравирани с  от едната страна и с  от другата.

ПРЕСТАРИУМ 10 mg се доставя в картонени кутии с 30 филмирани таблетки.



ПРЕСТАРИУМ 10 mg е инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), който се използва за лечение на високо кръвно налягане. Той действа като разширява кръвоносните съдове, което облекчава изпомпването на кръв от сърцето в тях.

2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ВЗЕМАТЕ ПРЕСТАРИУМ 10 mg

Не вземайте ПРЕСТАРИУМ 10 mg:

- Ако е известно, че имате алергия към периндоприл или някое от гореспоменатите помощни вещества, или към други ACE инхибитори,
- Ако сте бременна или кърмите,
- Ако сте получавали прояви, като свирене на гърдите, подуване на лицето или езика, силен сърбеж или тежки кожни обриви при предшестващо лечение с ACE инхибитор или сте имали такива прояви при други обстоятелства (състояние, наречено аngionевротичен оток).

ПРЕСТАРИУМ 10 mg не се препоръчва за употреба при деца и подрастващи.

Бъдете особено внимателни с ПРЕСТАРИУМ 5 mg:

Ако някое от следващите условия се отнася за Вас, моля, говорете с Вашия лекар преди да вземете таблетките:

- Ако имате аортна стеноза (стесняване на главния кръвоносен съд излизаш от сърцето) или хипертрофична кардиомиопатия (вид болест на сърдечния мускул) или стеноза на бъбрените артерии (стесняване на артериите снабдяващи бъбреца с кръв),
- Ако имате други сърдечни проблеми или проблеми с бъбреците си,
- Ако сте на безсолна диета или употребявате заместители на готварската сол, които съдържат калий,
- Ако имате диабет.


Трябва също да уведомите Вашия лекар или медицинския персонал, че вземате ПРЕСТАРИУМ 10 mg:

- Ако Ви предстои анестезия и/или голяма хирургична интервенция,
- Ако Ви предстои провеждане на бъбренча диализа с полиакрилонитрилни мембрани,
- Ако Ви предстои LDL афереза (което означава отстраняване на холестерол от кръвта с апарат),
- Ако Ви предстои десенсибилизиращо лечение за намаляване на ефектите при алергия към ужилване от пчели или оси,
- Ако насърко сте имали диария или повръщане.

Бременност и кърмене:

Не вземайте ПРЕСТАРИУМ 10 mg:

- Ако сте бременна, планирате да забременеете или ако подозирате, че сте бременна,
- Ако кърмите.



Шофиране и работа с машини:

ПРЕСТАРИУМ 10 mg не засяга будността, но при някои пациенти са възможни различни реакции, като замаяност или умора във връзка с понижение на кръвното налягане. Ако получите такава реакция, способността Ви за шофиране или за работа с машини може да бъде нарушена.

Прием на таблетките с други лекарства:

Лечението с ПРЕСТАРИУМ 10 mg на високото Ви кръвно налягане или на Вашата сърдечна недостатъчност може да бъде повлияно от други лекарства, които са Ви били предписани или сте купили в аптеката, като например:

- Други средства за високо кръвно налягане,
- Калий-спестяващи диуретици (спиронолактон, триамтерен), калиеви добавки или калий-съдържащи заместители на готварската сол,
- Литий за лечение на депресия,
- Антидиабетни средства,
- Нестероидни противовъзпалителни средства (напр., ибuproфен) или високи дози салицилати (напр., аспирин), трициклични антидепресанти, антипсихотици и анестетици.

Попитайте Вашия лекар, ако не сте сигури какви са тези лекарства.

Винаги трябва да информирате Вашия лекар или аптекар относно всички лекарствени средства, които вземате, даже и тези закупени без лекарска рецепта.

3. КАК СЕ ВЗЕМА ПРЕСТАРИУМ 10 mg

Общата дневна доза се определя и коригира от Вашия лекар. Тя ще бъде обично 5 – 10 mg веднъж дневно при повишено кръвно налягане.

Таблетките трябва да бъдат приемани с чаша вода, за предпочтение сутрин.

Лечението за повишено кръвно налягане или сърдечна недостатъчност обикновено трае цял живот.

Ако вземете по-голямо от предписаното количество таблетки:

В случай на предозиране, свържете се с най-близкото звено за бърза помощ или кажете незабавно на Вашия лекар. Най-вероятният ефект в случай на предозиране е ниско кръвно налягане. Ако настъпи изразено понижение на кръвното налягане (оплаквания, като замаяност или промаляване), може да бъде полезно заемане на хоризонтално положение с повдигнати долни крайници.

Ако пропуснете да вземете Вашите таблетки:

Важно е да вземате Вашето лекарство ежедневно. Все пак, ако пропуснете една или повече дози, вземете предписаната доза веднага щом се сетите за това и след това продължете приема, както Ви е предписано.

Не вземайте двойна доза.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Подобно на всички лекарствени продукти ПРЕСТАРИУМ 10 mg може да причини нежелани странични ефекти.

Te могат да бъдат: главоболие, замайване, световъртеж, парестезии, разстройства на настроението или съня, зрителни нарушения, шум в ушите, хипотония, кашлица (често описвана като суха и дразнеща), задуж, стомашно-



чревни нарушения (гадене, болки в корема, повръщане, запек), променен вкус, сърбеж, кожни обриви, уморяемост и мускулни крампи.

Тези странични ефекти, ако настъпят такива, са обичайно леки. Ако, обаче, почувствате някои от тези оплаквания или други неупоменати по-горе странични ефекти, трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

Ако почувствате някой от следните ефекти, спрете веднага приема на таблетките и кажете незабавно на Вашия лекар: оток на лицето, устните, устата, езика или гърлото, затруднение в дишането, необичайно ускорена или неравномерна сърдечната дейност.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ПРЕСТАРИУМ 10 mg

Пазете на недостъпно за деца място.

Пазете кутията пътно затворена.

Не употребявайте този лекарствен продукт след датата на годност, която е отбелязана четливо върху картонената опаковка.

Ако Вашият лекар реши да спре лечението, върнете всички останали таблетки на фармацевта. Задръжте ги, само ако Вашият лекар Ви каже да постъпите по този начин.

