

И А Л  
ОДОБРЕНО!  
ДАТА 04.07.06

**Информация за пациентта.**

**Моля, прочетете внимателно!**

## Vitamin E 200 - ZENTIVA®

### Витамин Е 200 – ЗЕНТИВА

#### Състав

#### Лекарствено вещество

Токоферол acetate (vitamin E) 200 mg в една капсула.

#### Помощи вещества

Растително олио, желатин, глицерол, метилпарабен, ягодово червено багрило (Е 124).

#### Лекарствена форма и опаковка

Капсули.

Съдържание на 1 опаковка:

10, 20 или 30 капсули

#### Притежател на разрешението за употреба

Зентива АД

Хлоховец, Словашка република

#### Фармакотерапевтична група

Витамин

#### Действие

Това е биологично най-ефективния токоферол. Витамин Е е стабилен като ацетат. Той действа като защитно съединение на клетъчните мембрани в тялото. Неговата липса се проявява главно в репродуктивната система, мускулната и сърдечносъдовата система.

#### Показания

Нарушения на фертилността (плодовитостта), менструални и климактерични заболявания.  
Дегенеративни заболявания на кожата и лигавицата на дихателните пътища.



Дегенеративни заболявания на нервната система (болест на Паркинсон, болест на Алцхаймер).

Профилактика и като част от лечението на атеросклероза, исхемична болест на сърцето, инфаркт на миокарда, профилактика на мозъчен удър.

Дегенеративни и възпалителни изменения на ставния апарат и лигаментите на гръбначния стълб и ставите.

Нарушения на храненето и влошена абсорбция (храна бедна на токоферол, недохранване, синдром на намалена абсорбция, състояния след операции на stomаха или червата, хранителна анемия, увреждания на черния дроб, включително хроничен активен хепатит и др.).

Някои ендокринни нарушения (щитовидна жлеза, полови жлези, стерилност при мъже).

Лекарственият продукт може да се прилага при възрастни, юноши и деца над 3 години.

#### **Противопоказания**

Лекарственият продукт не трябва да се прилага при свръхчувствителност към витамин Е или към някое от включените в състава помощни вещества.

Да не се прилага при деца под 3-годишна възраст.

#### **Специални предупреждения и предизвикани мерки при употреба**

Не се препоръчва продължително приложение на витамин Е през първия тримесец на бременността и по време на кърмене поради повишения рисков от тромбоемболизъм.

Други лекарствени продукти, съдържащи витамиини или минерали могат да се приемат само след лекарска консултация.

#### **Лекарствени взаимодействия**

Не са известни взаимодействия при прилагане на препоръчваните дози. При едновременно прилагане с желязо дневната нужда от витамин Е нараства. Едновременното приложение с лекарствени продукти понижаващи абсорбцията на липидите може да доведе до намаляване абсорбцията и на токоферол.

#### **Дозировка и начин на приложение**

Дозировката и начина на приложение се определят за всеки пациент индивидуално, в зависимост от естеството на заболяването.

Ако лекарят не е предписал друго, дозировката за възрастни е както следва:



При дегенеративни заболявания на нервната система и мускулна дистрофия се препоръчват до 2000 mg дневно за ограничен период от време. Тези високи дози трябва задължително да се консултират с лекар.

При останалите индикации деца над 12 години и възрастни приемат по 200 – 400 mg дневно за период от няколко седмици.

Дозировката при деца от 3 до 12 години се определя от лекар.

При деца под 3 години трябва да се използва друга, подходяща лекарствена форма (капки).

#### Начин на приложение:

Капсулите се поглъщат с чаша течност.

#### Предозиране

В случай на предозиране или инцидентно поглъщане на лекарствения продукт от дете потърсете лекарска помощ.

#### Нежелани лекарствени реакции

Лекарственият продукт обикновено се понася добре, но продължително приемане или високи дози в редки случаи могат да предизвикат стомашно-чревни разстройства (гадене, повръщане), тромбофлебити, вагинално кървене, уртикария (копривна треска), умора, слабост и главоболие. Приемането на високи дози витамин Е може да влоши вече съществуващи нарушения в съсирването на кръвта поради недостиг на витамин K.

В случай на нежелани лекарствени реакции или други нежелани ефекти трябва да се консултирате с Вашия лекар относно по-нататъшната употреба на този лекарствен продукт.

#### Съхранение

Да се съхранява под 25 °C. Да се пази от влага и светлина.

#### Срок на годност

3 години

#### Внимание

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!



Да не се употребява след изтичането на срока на годност, който е отбелязан върху опаковката.

Последна редакция: м. януари 2004 г.

**Адрес за контакти**

ТП Зентива Интернейшънъл АД  
бул. "Н. Й. Вапцаров" № 25, София 1407  
тел. 9 62 41 91, 9 62 41 40

